Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Die elektrischen Fische im Lichte der Descendenzlehre

Fritsch, Gustav

Berlin, 1883

Die elektrischen Fische im Lichte der Descendenzlehre

Elektrische Fische!? höre ich manchen meiner verehrten Leser ausrufen, der vielleicht zum ersten Male den Ausdruck überhaupt vernimmt. „Müssen denn in unserem Zeitalter, wo der Electricität als Spenderin von Kraft, Licht, Electrolyse, als Trägerin von Sprache, Ton und Schrift bereits so hohe Aufgaben gestellt sind, daß man das Zeitalter vorzugsweise das elektrische nennen möchte, auch noch die Fische auf Electricität dressirt werden?“ Mancher Anderer, der mit dem Reich der Thiere besser vertraut ist, sagt vielleicht: „O, was ein abgelegenes Gebiet! Was kann uns die Beschäftigung mit diesen Sonderbarkeiten der Natur nützen?“

Derjenige, welcher die vorliegenden Hefte regelmäßig liest, wird dagegen eine gewisse Einsicht in das scheinbar so abgelegene Gebiet bereits gewonnen haben, da vor nun mehr fast zehn Jahren (1874) Franz Boll in ihnen über den damaligen Stand der Kenntnisse elektrischer Fische berichtete. Viele Anschauungen haben sich seitdem verändert, mancher Fortschritt in der Erkenntniß ist gemacht worden, und Thatfachen, welche von Boll noch mit Mißtrauen betrachtet oder als unfruchtbar bei Seite geschoben wurden, haben sich als begründet und fruchtbringend erwiesen. Manches Räthsel, welches sich an dies Kapitel knüpft,

ist der Lösung nahe gebracht worden oder wirklich gelöst, neue, früher noch ungeahnte Räthsel haben sich gleichzeitig geschürzt.

Wie ein gewaltiger Strom dringen zahlreiche Fragen von höchster Wichtigkeit auf diejenigen ein, der sich diesen Studien widmet; sie führen ihn mitten hinein in die schwierigsten Probleme unserer allgemeinen Nerven- und Muskel-Physik, werfen ihre Streiflichter in das Gebiet der Elektrotherapie, und schneiden tief ein in die Theorien der Entwicklungslehre. So ist es nicht zu verwundern, daß die elektrischen Fische mit stetig ansteigender Theilnahme betrachtet werden, daß die Literatur, welche sich mit ihnen beschäftigt, zu einem staunenswerthen Umfang anschwillt; und doch müssen wir mit ebenso großem Bedauern wie Sicherheit eingestehen, daß eine auch nur annähernde Erschöpfung des Thema's selbst in Menschenaltern nicht zu erhoffen ist.

Unter den vielen hier aufgegebenen Räthselfragen, sind es besonders zwei, welche ihrem Wesen nach in weiteren Kreisen Beachtung und Theilnahme erwecken, und das abgelegene Gebiet uns näher rücken müssen; sie lassen sich etwa folgendermaßen formuliren: Wie findet in der Organisation irgend eines Fisches eine elektrische Batterie Platz zur Entwicklung und Verwendung, während die verwandten Fischarten Nichts davon zeigen? Und ferner: Wie setzt sich der elektrische Apparat auf den Willensimpuls des Thieres plötzlich in Thätigkeit? oder mit anderen Worten: In welchem Verhältniß und Wechselwirkung steht das Nervenprincip zur frei werdenden Electricität des Thieres?

Es liegt auf der Hand, daß selbst eine nur unvollkommene Einsicht in die geheimnißvolle Werkstätte der Natur, welche so

hochstehende, wohl organisirte Thiere scheinbar nach Gutdünken mit einer äußerst machtvollen, complicirten Maschinerie versieht, gerade an besonders merkwürdigem Beispiel die Grundprincipien enthüllen wird, nach denen sich die Organisationen der Lebewesen überhaupt gestalten; sie wird uns belehren über die enorme Breite der Abänderung in den Organanlagen selbst der Wirbelthiere und so eine wichtige Unterlage schaffen für die allgemeinen Vergleichen, welche die Reihen der Thiere bis zum Menschen hinauf in das richtige Verhältniß zu einander setzen sollen.

Diese Anschauung geht von der Voraussetzung aus, daß die engen, verwandtschaftlichen Beziehungen der elektrischen Fische mit nicht elektrischen Arten es absolut undenkbar erscheinen lassen, der elektrische Apparat mit allem Zubehör sei den Thieren von der Natur als ein Ganzes fertig eingesetzt, wie etwa ein Feldherr seine Krieger mit Feurgewehren ausrüstet, nachdem er erkannt hat, daß sie mit der blanken Waffe allein nicht genug ausrichten, sondern daß ein unbestimmtes Etwas in der gemeinsamen Organisation der elektrischen und nicht elektrischen Verwandten bei ersteren in den elektrischen Apparat durch Naturzucht verwandelt wurde. Nur durch diese Voraussetzung allein, welcher sich Voll unbegreiflicher Weise ablehnend gegenüber stellte, kann die Betrachtung der elektrischen Fische fruchtbringend auf unser Verständniß der Entwicklung der Lebewesen wirken. Wir dürfen zur Zeit bereits dreist behaupten, daß diese Hoffnung sich in hohem Maße erfüllt hat, und die Frage nach der stammesgeschichtlichen Entwicklung der elektrischen Organe ihrer endgültigen Lösung erheblich näher gebracht wurde.

Wenn die nachstehenden Blätter auch vornehmlich über dies Kapitel handeln sollen, so muß es doch als unvermeidlich erachtet werden auch der zweiten Cardinalfrage: Wie der Willens-

impuls den elektrischen Schlag herbeiführt? näher zu treten. Auch für dieses, leider noch sehr dunkle Gebiet schaffte die Untersuchung der Herkunft des lebendigen elektrischen Apparates eine sichrere und breitere Grundlage, so daß sich besonders vom Standpunkt der praktischen Physiologie und der Medicin große Verheißungen an die Lösung des Problems knüpfen; die Resultate werden auf den menschlichen Körper anwendbar sein, eben weil der elektrische Apparat des Fisches kein Organ durchaus eigenster Art darstellt, sondern seine Anlage mit solchen auch unseres Körpers vergleichbar ist.

Möchten sich diese Verheißungen wenigstens zum Theil recht bald erfüllen!

Aber abgesehen von den bezeichneten Fragen von hervorragender Wichtigkeit tauchen bei der Betrachtung links und rechts noch andere von kaum geringerem Interesse vor uns auf, welche erörtert sein wollen, z. B.: Wie es zugeht, daß die mächtigen elektrischen Schläge der Fische ihre eigenen Muskeln, die Brut in ihrem Leibe oder andere gleichartige Genossen ihrer Umgebung scheinbar unberührt lassen?

Das unbeschreibliche, peinliche Gefühl, welches wir heutigen Tages einen elektrischen Schlag nennen, mußte auf den Naturmenschen einen um so gewaltigeren Eindruck hervorrufen, je geringer das Verstandniß war, was die räthselhafte Erscheinung bedeute? Daher machten sich auch die elektrischen Fische schon dem Menschengeschlecht in seiner Kindheit bemerkenswerth sowie gefürchtet, und zwar war es begreiflicher Weise gerade diese ihre unheimliche Kraft, welche als das charakteristischste Merkmal bei der Benennung Berücksichtigung fand. Sehr wahrscheinlich ist es, daß die Kenntniß der elektrischen Fische bis in die vorhistorische Zeit hinaufreicht, die erste sichere Kunde eines

solchen erhalten wir auf den bildlichen Darstellungen der alten Aegypter.

Sieht man z. B. in dem berühmten Grabtempel des Ti zu Saſara, der so reich ist an thierischen Darstellungen, den fürstlichen Mann auf seiner Nilbarke zum Fischfang ausfahren, so fehlt unter dem mancherlei Gethier, welches die Fluth unter der Barke belebt, nicht ein eigenthümlicher, welsartiger Fisch mit einer Anzahl langer, wurmförmiger Anhänge um das Maul. Die Abbildung bezeichnet unzweifelhaft den noch heute im Nil lebenden, elektrischen Wels (*Malopterurus electricus*), dessen elektrische Kraft so groß ist, daß sie gewiß nicht leicht Jemandem verborgen bleibt, der ihn lebend in die Hand bekommt.

Aber auch einem anderen Nilfisch, wurde schon damals besondere Beachtung geschenkt; er findet sich nicht nur auf den eben angeführten Wandgemälden, sondern er wurde sogar als heilig verehrt und eine Stadt Unterägyptens (*Oxyrhynchos*) nach ihm benannt, ohne daß dafür ein hinreichender Grund bekannt geworden ist. Sollte vielleicht die elektrische Natur dieses Fisches (*Mormyrus* der wissenschaftlichen Nomenclatur), welche selbst Boli noch nicht kannte, den alten Aegyptern bereits bekannt gewesen sein und dem Fisch die besondere Beachtung eingetragen haben? Dies wäre um so bemerkenswerther, als der *Mormyrus* nur zu den schwächeren elektrischen Fischen gezählt werden kann und seine Kraft auch neueren Forschern so wenig deutlich enthüllte, daß die elektrische Natur bis in die jüngste Zeit hinein angezweifelt wurde.

Weit im zoologischen System von *Malopterurus* und *Mormyrus* getrennt steht der elektrische Fisch des Meeres, wie man ganz allgemein sagen kann; denn die zu ihm zählenden Formen finden sich in allen Meeren, deren Temperatur nicht unter die-

jenige der gemäßigten Zonen sinkt, sie bevorzugen aber die wärmeren Meeresbecken und entwickeln sich hier in großer Zahl. Besonders ausgezeichnet durch ihr Vorkommen ist das mittelländische Meer, wo sie unvermeidlich schon den Fischern des grauen Alterthums bekannt geworden sein müssen. Setzt in mehrere Gattungen und Untergattungen getrennt, faßte man früher die Formen unter dem Gattungsnamen *Torpedo* oder noch früher als *Raja torpedo* zusammen, da *Raja* „Kochen“ bezeichnet und diese elektrischen Fische des Meeres den Kochen in der That verwandt sind.

Die bemerkenswertheste Eigenschaft des elektrischen Kochen, das Austheilen dieser räthselhaften, erschütternden und betäubenden Schläge ist auch hier in den Namen übergegangen und wird auf dieselbe sowohl durch die lateinische Bezeichnung „*Torpedo*“, wie die französische „*Torpille*“, die italienische „*Tremola*“, die altgriechische „*Narke*“, die neu-griechische „*Mudiastra*“, die arabische „*Raäd*“ oder „*Raäsch*“ hingewiesen. Alle diese Worte enthalten Stämme, welche Betäuben oder Erschüttern bedeuten und sind nicht für den elektrischen Fisch erfunden, sondern auf denselben übertragen worden, als seine Leistungen bekannt wurden, ohne daß dadurch, wie mir scheint, über die Zeit, wann diese Uebertragung stattfand, irgend etwas ausgesagt würde. So bedeutet der arabische Namen „*Raäd*“ auch „Donner“; man betonte also durch den Namen nur, daß eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der erschütternden Wirkung des Donners auf unser Nervensystem und der Berührung des elektrischen Fisches bestünde, an eine innere, nähere Verwandtschaft zwischen beiden Erscheinungen war keinesfalls gedacht.

Jedes Thier, welches dieser Kraft theilhaftig war, verdiente den betreffenden Namen in gleicher Weise, und wir sehen daher

bis auf den heutigen Tag verschiedene elektrische Fische unter demselben Namen auftreten. „Narke“ ist bei den Alten Torpedo, gelegentlich aber auch Malopterurus, „Raâsch“ heute im Delta und in Suez von der arabisch sprechenden Bevölkerung ebenfalls für beide Gattungen im Gebrauch. War doch die erschütternde Wirkung des elektrischen Fisches allmählich eine so landläufige Vorstellung geworden, daß der Name des bekanntesten, Torpedo, erhalten mußte, um die künstlichen Zerstörungsmaschinen zu bezeichnen, welche tückisch im Wasser verborgen, oder als Fisch-Torpedo lancirt, dem Torpedo-Fisch naheisern, um durch erschütternden Schlag den berührten Gegenstand zu verderben!

Auch der viel später (1672)¹⁾ bekannt gewordene elektrische Fisch der süßen Gewässer Central-Amerika's, dem seine langgestreckte Körpergestalt den Namen eines „Zitter-Aales“ eingetragen hat, ohne daß er indessen dem Aalgeschlecht so nahe verwandt wäre wie den Welsen (*Gymnotus electricus* im System benannt) konnte dem Schicksal nicht entgehen, seine unheimliche Kraft im Namen verrathen zu sehen. Die spanisch sprechende Bevölkerung fürchtet ihn als „Temblador“, den Erschütterer, und wählte somit dasselbe Bild zur Vergleichung, wie die arabische Bevölkerung Aegyptens für die elektrischen Fische ihrer Heimath in dem Worte „Raâsch.“

Die üblen Erfahrungen, welche man durch unvorsichtiges Hantiren der elektrischen Fische machte, umfaßten für lange Jahrhunderte fast die einzigen Beobachtungen, welche zu registriren waren; sie machten dieselben gefürchtet und zum Gegenstande des Aberglaubens, ohne daß die menschliche Erkenntniß darin irgend einen namhaften Schritt vorwärts gethan hätte. Wie die alten Aegypter den Malopterurus und Mormyrus ihren Wandgemälden einreichten, so sehen wir die Torpedo des tyr-

rhenischen Meeres nicht selten unter den Mosaikbildern der pompejanischen und anderer römischen Bauten. Sie erweckte den Erbauern etwa das gleiche Interesse wie reißende Thiere, giftige Schlangen und andere Schrecknisse der Natur, welchen andererseits auch heilsame Wirkungen zugetraut wurden. Die Naturwissenschaften mußten erst namhafte Fortschritte machen, es mußte erst eine Lehre von der Elektrizität geschaffen sein, bevor die Vergleichung der durch die Fische bewirkten Erschütterungen mit Donner und Blitz einen realen Boden hatte.

Voll hat in der bereits citirten Abhandlung in übersichtlicher Darstellung den Weg skizzirt, welchen die allmählich ansteigende Erkenntniß der Natur der elektrischen Fische und ihrer Kraftleistungen gemacht hat. Um Wiederholungen zu vermeiden wird es an dieser Stelle genügen, was die historischen Daten anlangt, auf jene Abhandlung verwiesen zu haben und alsbald die Organisation der Thiere näher in's Auge zu fassen.

Seit Francesco Redi's²⁾ Untersuchungen (1666) wissen wir, daß die räthselhafte Kraft der elektrischen Fische nicht etwa eine diffus im Körper verbreitete ist, sondern daß in der That ein besonderer elektrischer Apparat, ein elektrisches Organ vorhanden ist, in dem sich dieselbe entwickelt. Beim Bitterrochen, der zuerst genauer untersucht wurde, findet sich jederseits von dem Kopfe und nachfolgenden Kiemengerüst ein etwa nierenförmiges Organ, welches der Körperscheibe des Fisches so eingefügt ist, daß es dieselbe von der Rücken- zur Bauchseite völlig durchsetzt. Herausgenommen zeigt diese nierenförmig umgrenzte Scheibe etwa das Ansehen einer Honigwabe, da sie aus lauter unregelmäßig sechsseitigen Säulchen zusammengesetzt ist, die senkrecht aneinander gereiht sind und sich in jedem Organ auf mehrere Hundert belaufen. Die weiche, gallertige Substanz der Säul-

chen erkennt man mit bloßem Auge als aus feinen Plättchen zusammengesetzt, und wird dadurch in der That das Bild des bekannten galvanischen Apparates, die aus Plattenpaaren aufgebaute Säule, so vollständig wiedergegeben, daß schon der Erfinder derselben, Alexander Volta, nicht umhin konnte, die natürlichen Säulchen des Zitterrochen mit seiner künstlich hergestellten zu parallelisiren.

Die Seitenansicht der Säulchen des Organs erhält man also, indem man den Körper des Thieres quer vom Rücken zum Bauch durchschneidet, wie es die umstehende Skizze, Fig. 2, anschaulich macht. Fig. 1 bietet dagegen die Rückenansicht bei geöffneter Schädelkapsel und von der Haut entblößten Organen; hier zeigen sich links und rechts je vier Nervenstämme, welche vom verlängerten Mark fächerförmig ausstrahlend zu den Organen verlaufen. An der Ursprungsstelle derselben am Centralnervensystem liegen zwei längliche, gelblichgraue Körper, wie zwei Kaffeebohnen aneinander gedrängt: dies sind die beiden sogen. elektrischen Lappen des Gehirns (A. v. Humboldt's citronengelbe Körper), in welche hinein sich die Fasern der elektrischen Nerven verfolgen lassen.

Wie Muskeln sehen also die elektrischen Organe des Zitterrochen nicht aus, und es ist daher um so auffallender, daß Francesco Redi sie als „die sichelförmigen Körper oder Muskeln“, seine Nachfolger sie meist direkt als „sichelförmige Muskeln“ ansprechen. Der Instinct des Genius führte Redi auf eine Vergleichung, in welcher wir heutigen Tages noch den Schlüssel zu einem wichtigen Theil der räthselhaften Thatsachen hinsichtlich der elektrischen Fische in der Hand zu halten glauben!

Die eigenthümliche, man möchte sagen „unregelmäßige Regelmäßigkeit“ der Anordnung der Organsäulen, ihre Größe und

Fig. 1.

Torpedo marmorata (Bitterrochen).
Rückenseite.

Die elektrischen Organe, dazu gehörige Nerven (rechts) und das Gehirn nebst Rückenmark sind bloß gelegt.

Fig. 2.

Rücken.

Bauch.

Senkrechter Durchschnitt durch das Kopfsende von *Torpedo marmorata*.

Zahl fanden nur wenig Beachtung, wenn auch einzelne Anatomen sich flüchtig damit beschäftigten. Darunter verdient an erster Stelle John Hunter rühmlichst genannt zu werden, obwohl ein besonderes Verhängniß durch ungenügende Bestimmung des verwendeten Materials ihn dabei zu einem folgenschweren Irrthum verleitete. Die Zoologie lernte erst viel später die Nothwendigkeit erkennen, sich bei der Artbestimmung vornehmlich auf die Anatomie zu stützen, und wir sehen noch 1833 in Lucien Bonaparte's Prachtwerk über die Thierwelt Italiens bei der Beschreibung der Zitterrochen ihrer elektrischen Organe nur ganz ungenügend Erwähnung gethan; so geschieht es selbst bei einer als neu beschriebenen Art *T. nobiliana* Bon., von der nach einer Notiz, die ich der Güte meines Freundes Prof. Giglioli verdanke, zur Vergleichung in Italien nur drei ausgestopfte Häute existiren!

Schon der Vollständigkeit der Beschreibung wegen hätten wohl so wichtige Organe Berücksichtigung finden sollen, diese Untersuchung hat sich aber um so unerläßlicher herausgestellt, als die verschiedenen Arten der Zitterrochen in Säulenzahl und Anordnung der Organe erheblich von einander abweichen. So ist es gekommen, daß John Hunter³⁾, indem er, ohne es zu wissen, ein Exemplar abweichender Species unter den übrigen hatte, welches bei auffallender Größe etwa doppelt so viel Säulen in jedem Organ zeigte wie die gewöhnlichen Zitterrochen, zu dem Irrthum verführt wurde, die Säulenzahl nehme mit dem Wachsthum des Thieres zu. Thatsächlich vermehrt sich die Säulenzahl nicht mehr, nachdem in dem Embryo des lebendig gebärenden Fisches die elektrische Organanlage ihre charakteristische Gestalt erlangt hat.

Dies Wachsthumsgesetz, welches nach den Autoren, die es

zuerst erkannten, von Hrn. du Bois-Reymond als das delle Chiaje-Babuchin'sche Gesetz von der Präformation der elektrischen Elemente bezeichnet wird, ist von besonderer Wichtigkeit für die Theorie über die Wirkung der elektrischen Organe.

Aber auch für die allgemeinen Anschauungen über die Bedeutung der elektrischen Fische erscheint die Kenntniß der riesenhaften Torpedo-Art, welche Hunter's Zählung zu Grunde lag, als ungemein werthvoll. Während die verbreitetste Art der europäischen Meere meist nur 20—30 cm, außergewöhnlich große nur gegen 70 cm lang sind und ihr elektrischer Schlag für den erwachsenen Mann wohl unangenehm aber nicht unerträglich wird, erreicht der den ostamerikanischen Küsten eigene Zitterrochen, welcher als *T. occidentalis* Storer bezeichnet worden ist, die doppelte Größe und charakterisirt sich so als der umfangreichste und schwerste, wenn auch nicht längste aller elektrischen Fische.

Ich lasse die wichtigsten Daten über die eben genannte Art, wie sie Hr. du Bois-Reymond die Güte hatte für den Bericht über meine diesbezüglichen Arbeiten zusammenzustellen, in seiner Fassung hier folgen, da dieselben am besten im Stande sind die Mächtigkeit des Thieres anschaulich zu machen. „Die Kenntniß der *T. occidentalis* verdankt man wesentlich einem Seefischer von Gewerbe, Captain Nathaniel C. Atwood von Provincetown, an der Spitze des Cape Cod, welches südlich von Boston die nach Nord offene Cape Cod Bay vom Ocean trennt. Nach Atwood's Bericht stranden die Riesen-Zitterrochen im September, Oktober und November, je nach den Jahren in wechselnder Häufigkeit, auf der sandigen Ostküste des Cape Cod. Die kleinsten sind zwei Fuß lang und wiegen nicht über zwanzig Pfund; die größten nach Storer fünf Fuß engl. (152 cm) langen, schätzt Atwood, ohne sie wirklich gewogen zu haben, auf 170

bis 200 Pfund. Der größte Umfang der Scheibe betrug nach ihm zwölf Fuß, oder ihr Durchmesser etwa vier Fuß. Der Schlag war so stark, daß Atwood mehrmals davon zu Boden stürzte, „wie mit der Art gefällt.“ Doch kam es auch vor, daß die Thiere nicht schlugen. Die Schläge wurden durch eine Harpune, ein Seil auf acht bis zehn Fuß Abstand vom Fische gespürt und waren beim Ausweiden sehr hinderlich, welches wegen des Deles aus der Leber geschah.“

Einer dieser Riesen, welche die hohe See lieben und so gelegentlich, wenn auch sehr selten, mittelst des Golfstromes an die Küsten von England geführt zu werden scheinen, ist es jedenfalls gewesen, der unter Hunter's Secirmesser gelangte und noch jetzt zu London im Museum des Royal College of Surgeons sein mächtiges Centralnervensystem nebst einem Stück des linken Organs an sauberem Präparat bewundern läßt.

Wenn wir in diesen ungeheueren Gestalten die schaffende Naturkraft sich noch in heutiger Zeit vor unseren erstaunten Augen allgewaltig enthüllen sehen, so verlieren freilich die versteinerten Reste einer Torpedo-Art aus den Tertiärschichten des Monte bolca, welche, bevor wir *Torpedo occidentalis* kennen lernten, durch ihre Größe gerechtes Aufsehen machte, für uns an Ansehen und Bedeutung; denn der dafür gewählte Name, *T. gigantea*, gebührt ihr im Vergleich mit der amerikanischen Art gar nicht mehr, weil letztere die bisher gefundenen versteinerten Reste in ihren Dimensionen erheblich überragt (152 cm : 133 cm). Vielleicht werden in späterer Zeit noch Reste größerer Exemplare der versteinerten Art gefunden, welche der *Torpedo occidentalis* jedenfalls sehr nahe steht, wenn sie nicht überhaupt mit ihr identisch ist. Hat aber auch die seit jener Epoche unserer Erde eingetretene Umgestaltung der or-

ganischen Schöpfung beide Formen in einem oder dem anderen Punkte getrennt, so kann doch keinesfalls auf das Auffinden einer einzigen, fossilen Art, zumal dieselbe noch lebenden Formen durchaus verwandt ist, die Anschauung gegründet werden, es habe in früheren Perioden eine ausgebreitete Fauna elektrischer Fische gegeben, deren jetzt lebende Repräsentanten wir als einen sehr zusammen geschmolzenen Rest jener Fauna zu betrachten hätten. Es kommt ja auf über 50 jetzt lebende Arten von elektrischen Fischen bis heute nur eine versteinerte Art! Auf diese mißverständlich auf Darwin⁴⁾ zurückgeführte Theorie, welche Boll die annehmbarste gewesen zu sein scheint, ist weiter unten nochmals zurück zu kommen.

An *Torpedo occidentalis*, welche über 1000 Säulen in jedem Organ zählt, schließt sich ein anderer Zitterrochen des atlantischen Ocean's, welcher bei Madeira vorkommt, aber wegen großer Seltenheit bisher noch nicht genauer bekannt wurde, nämlich *T. hebetans* Lowe. Das in Europa einzig vorhandene Exemplar der Art im British Museum hat nur die Größe einer mittleren gemeinen *Torpedo marmorata*, es zählt aber etwa ebensoviele Säulen (1025) als die amerikanische Art, der sie auch im Außern merkwürdig ähnlich sieht.

Gleichfalls durch eine sehr hohe Säulenzahl (895) zeichnet sich eine leider auch nur vereinzelt in Europa (Berliner zool. Museum und Physiolog. Institut⁵⁾) vorhandene Art aus, *T. californica* von der Westküste Amerika's, welche auch der atlantischen ähnlich sieht, ohne jedoch ihre Größe zu haben, da diese Stücke nur 19,8 cm und 31,5 cm lang sind. Nach brieflichen Mittheilungen kommt *T. californica*, die hauptsächlich in der Bay von Monterey und San Diego gefangen wird, daselbst gelegentlich in erheblich größeren Exemplaren vor, als die Ber-

liner es sind, wenn auch Nichts von den Riesendimensionen der *T. occidentalis* verlautet. Die Möglichkeit, daß beide Arten zusammen gehören, obwohl sich der ganze amerikanische Continent zwischen sie schiebt, ist nicht ausgeschlossen. Ueber *T. hebetans* fehlen nähere Daten hinsichtlich des Vorkommens gänzlich, obwohl Madeira gleichsam vor den Thoren Europa's liegt, und es manchem Forscher erwünscht sein müßte, über das Verhältniß der *T. hebetans* zu *T. occidentalis* ⁶⁾ aufgeklärt zu sein.

So bieten sich schon durch Betrachtung dieses einen Formenkreises der Zitterrochen höchst interessante Gesichtspunkte, sowohl über geographische Verbreitung und lokale Umwandlung der Arten als auch den früheren Zusammenhang ganzer Meeresfaunen mit einander, welche jetzt durch lang sich hinziehende Ländermassen getrennt sind. Dazu kommt noch im betreffenden Falle die Möglichkeit einer engeren Beziehung zu der bereits seit Jahrtausenden ausgestorbenen Art des Monte bolca.

Die Ueberzeugung, daß gerade an dieser Stelle tiefere Einblicke in das Werden der Arten, in die Ausbildung localer Varietäten zu sogenannten guten Arten zu gewinnen seien, wird weiter verstärkt, wenn wir den Formenkreis der *Torpedo marmorata* mit in die Betrachtung ziehen. Diese am genauesten untersuchte Art hat eine erstaunliche geographische Verbreitung, indem sie sowohl im atlantischen Ocean an den Küsten von Portugal und Frankreich, als auch im Mittelmeer allerwärts häufig gefangen wird und sogar im indischen Ocean bis herunter nach Madagascar gelegentlich vorkommt.

Bei dieser großen Verbreitung ist die Ausbildung von Lokalvarietäten leicht begreiflich, so daß selbst in dem engen Mittelmeerbecken mehrere derselben unterschieden werden können. Es ist hier nicht der Ort auf die bereits von Olfers gegebene Auf-

zählung verschiedener Varietäten der *Torpedo marmorata* einzugehen, da auch von ihm die elektrischen Organe bei der Abgrenzung unberücksichtigt gelassen wurden.

Gerade bei der genannten Art ist aber die Breite der individuellen Abänderung auch an den Organen sehr bemerkenswerth, insofern bei der gewöhnlichen Form schon die Säulenzahl zwischen 440 und 570 und darüber schwankt, d. h. um mehr als ein Viertel der Gesamtzahl. Bestimmte, schon äußerlich durch Färbung und Zeichnung kenntliche Varietäten, die daher unter besonderem Namen geführt werden können, gehen noch über die angeführte Zahlengrenze hinaus, d. h. übersteigen die Zahl von 600 in jedem Organ, und nähern sich also schon sehr bedeutend den zuerst genannten Arten. Wahrscheinlich gehörte auch die *T. nobiliana* Bonaparte's dem Formenkreise der *T. marmorata* als Varietät an; unter Berücksichtigung der ihr am nächsten stehenden Abart, würde ich bei *T. nobiliana* ebenfalls eine Säulenzahl von etwa 600 erwarten.

Denkt man sich solche Lokalvarietäten des Zitterrochen in ihrem Vorkommen genügend lange isolirt, um die Zahl der Rückschläge in die Stammart allmählich geringer werden und die Merkmale durch Behinderung erneuter Kreuzung mit frischem Blut von außerhalb sich mehr befestigen zu lassen, wird der Systematiker es kaum vermeiden können, die so wohl unterschiedenen Formen als Species gelten zu lassen.

Um dem Leser einen Ueberblick der großen Menge elektrischer Fische allein aus der Familie der Torpedineen zu geben, lasse ich hier die Namen der zur Zeit bekannten mit den zugehörigen Zahlen der elektrischen Säulen eines Organes folgen, soweit solche bisher festgestellt wurden.

An *T. marmorata* mit ihren Varietäten reiht sich *Torpedo*

fuscomaculata Pet.. der Küste von Mozambique mit 593 Säulen, die den Gesamtdurchschnitt der *T. marmorata*-Varietäten also noch übertrifft; dann *T. panthera* Ehr. und *T. sinus persici* Rüp. mit 449 Säulen; dann *Hypnos subnigrum* der australischen Meere (436 Säulen), dann erst der andere Zitterrochen des Mittelmeeres, *Torpedo ocellata* mit 432 Säulen. Es folgt nun *Narcine brasiliensis* Südamerika's (428 S.), *N. tasmaniensis* Neu-Seeland's (278 S.), *N. lingula* von China (274 S.), *N. timlei* (224 S.) und *N. indica* (145 S.)⁷⁾ des indischen Oceans, *Astrape capensis* des Cap der guten Hoffnung (147 S.), *Temera Hardwicki* des stillen Oceans (139 S.), *A. dipterygia* von Japan (132 S.): gewiß eine stattliche Reihe von Gattungen und Arten, die hier in absteigender Reihe hinsichtlich der Entwicklung ihrer elektrischen Organe geordnet wurden. Lage und allgemeine Anordnung dieser Theile ist überall etwa dieselbe, die Figuration und Gruppierung der Säulen unterliegt dagegen mannigfachen Verschiedenheiten.

Ein durchaus anderes Bild bietet dem Beschauer hingegen der elektrische Fisch des süßen Wassers aus Amerika, (*Gymnotus electricus*), dem seine langgestreckte Körpergestalt (Vergl. Fig. 3) den unverdienten Namen eines Aales eingetragen hat, obwohl es doch auch andere lange Fische giebt, die keine Aale sind; er wird aber nun wohl der „Zitteraal“ bis ans Ende aller Dinge bleiben. In ihm hat die Entwicklung der elektrischen Organe eine erstaunliche Mächtigkeit erlangt und sie ist es in der That, welche, in den Schwanzabschnitt des Thieres verwiesen, dem eigentlich ganz kurzen Fisch zu seiner bemerkenswerthen Länge verhilft, während der Aal auch abgesehen vom Schwanz wirklich ein langer Fisch ist. Der Kopf mit der gesammten Leibeshöhle nimmt nur etwas mehr als den fünften Theil des Körpers ein und der nach vorn umbiegende Darm

Fig. 3.

Gymnotus electricus (Bitteraal). Seitenansicht.

endigt im Alter an der Kehle des Fisches. Die übrigen vier Fünftel des Körpers sind wie der Querschnitt Fig. 4 es unter „O“ angedeutet, zum größten Theil von einer gallertigen, durchscheinenden Substanz eingenommen, welche zwei große Massen oder Organe bildet, die von den Seiten der Leibeshöhle aus, sich allmählich verjüngend, bis in die äußerste Schwanzspitze reichen, während zwei kleinere solche Massen („o“ der Figur), unter den ersteren gelagert, etwas weiter nach hinten beginnen und im Schwanzende zuweilen schon wieder schwinden. Die ganze Rumpfmuskulatur wird durch die großen Organe nach dem Rücken zu verdrängt und auch die Flossenmuskulatur kann wegen der unteren kleinen Organe ihren Platz nicht vollständig behaupten; in der Körpermitte stoßen die Organpaare aneinander.

Genauere Betrachtung zeigt auch hier die sulzige Masse von festeren Scheidewänden durchsetzt, welche von der mittleren Hauptscheidewand zum äußeren Umfang des Körpers verlaufen und von der Seite gesehen erkennt man, daß die Zwischenräume dieser Wände in senkrechter Richtung (den Fisch stets horizontal gedacht) wiederum eine Anordnung von Platten erkennen lassen. Die scheinbar so große Abweichung vom Bau des Torpedo-Organes verliert sich also fast gänzlich, wenn man berücksichtigt, daß die bei letzterem polygonalen, kurzen Säulen senkrecht stehen, bei ersterem an Stelle derselben niedrige aber breite Prismen vorhanden sind, die horizontal lagern und eine beträchtliche Länge erreichen; dort sind die ebenfalls vieleckigen Platten der Säulen horizontal gelagert, hier die etwa bandsförmigen Platten senkrecht gestellt.

Die zu den Organen tretenden Nerven kommen vom Rückenmark und treten in gleicher Weise zwischen den Wirbeln aus, wie es auch sonst der Fall ist, es giebt also deren eine sehr be-

Fig. 4.

Senkrechter Durchschnitt des *Gymnotus electricus* etwa durch die Mitte
des ganzen Fisches.

trächtliche Zahl, ebenso wie Rückenwirbel, und das Rückenmark selbst unterscheidet sich äußerlich nicht auffallend von dem eines andern verwandten Fisches, z. B. des gemeinen Welses.

Die Länge dieses in den kleineren Flüssen und Lagunen des Orinokogebietes besonders häufigen, aber auch im Amazonas vorkommenden *Gymnotus electricus* erreicht 2,5 m bei entsprechender Dicke, die wenig hinter der eines menschlichen Schenkels mittlerer Stärke zurückbleibt. Ein solch riesiges Exemplar war 1878 in der Berliner Fischerei-Ausstellung in ausgestopftem Zustande vorgeführt, und stellte also in der That den längsten elektrischen Fisch dar, sein Gewicht würde aber nach Schätzung nur etwa 40 Pfd. betragen haben oder noch nicht die Hälfte von demjenigen der größeren Riesen-Zitterrochen der nordamerikanischen Küsten. An elektrischer Kraft dürfte er sich aber wohl mit dem Rochen messen können; denn nach allen Berichten der Reisenden, seit v. Humboldt bis herab auf die reichen Erfahrungen meines zu früh verstorbenen Freundes Sachs sind die fürchterlichen Schläge der großen *Tembladores* ein Schrecken der Einwohner und eine beständig drohende Gefahr beim Passiren der Furthen, in denen häufig die Lastthiere, von den Schlägen betäubt, rettungslos untergehen. Ist man doch gezwungen gewesen, selbst Straßen zu verlegen, wegen der Häufigkeit der Zitteraale in den zu passirenden Gewässern! Die lebend nach Europa gebrachten, obwohl nur von mittlerer Größe und durch die Gefangenschaft geschwächt, erfüllten ihren Wasserbehälter noch von so gewaltigen elektrischen Stromcurven, daß die eingetauchte Hand selbst an der dem Fisch entgegengesetzten Seite der Wand zu schleunigem Rückzug gezwungen wurde.

Gegenüber diesem Heros der elektrischen Fische ist der nun zu erwähnende *Mormyrus* ein sanftes Gemüth; sein deutscher

Name „Nilhecht“ ist ein ebenso bemerkenswerther *Lucus a non lucendo* wie der „Zitteraal“, da jener so wenig Hecht ist, wie dieser Aal. Den gewaltigen, mit langen, nadelspitzen Zähnen bewaffneten Rachen des Hechtes sucht man bei dem Geschlecht der *Mormyri* vergeblich; ja es ist sogar charakteristisch für sie, daß sie nie „das Maul auf dem rechten Fleck haben.“ Einmal ist das kleine, mit dürftigen Zähnen versehene Maul an das Ende eines nach abwärts gekrümmten Rüssels verlegt (*M. oxyrhynchus*, *caschiwe*, *Hasselquistii*, *longipinnis*, *Geoffroyi*) oder es ist nach oben verlegt, während die Unterlippe stark vorspringt (*M. cyprinoides*) oder es liegt im Gegentheil ganz unten an dem stark abgerundeten Vorderkopf (*M. bovei*, *bane*); nur *Mormyrus dorsalis* und *elongatus* haben die Mundöffnung ziemlich an normaler Stelle, doch bleibt noch die geringe Größe auffallend.

Durch so enge Pforte kann natürlich keine umfangreiche Beute eingehen, und es wäre daher eine gewisse Verschwendung der Natur, den Fisch mit riesiger Kraft auszustatten, während er nur kleine Thierchen zu bewältigen hat. Die geringe Stärke der elektrischen Schläge ist neben ungeeigneter Ableitung des Organs der Grund gewesen, weshalb man die elektrische Natur des Fisches so lange verkannt hat, während schon im Jahre 1832 Rüppell⁸⁾ ein Organ an ihm nachwies, welches den bereits bekannten elektrischen merkwürdig ähnlich war. Die endliche Entlarvung des heimlichen Sünders, an welcher der Verfasser wesentlich theilhaftig war, ist in mehrfacher Hinsicht von großem, allgemeinem Interesse.

Vordem war man mit Rücksicht auf die Ähnlichkeit der eigenthümlichen Organe mit elektrischen gezwungen, für dieselben, da keine Entladungen von ihnen bekannt waren, eine besondere

Kategorie zu bilden, die man nach Hrn. du Bois-Reymond's Vorgang „pseudo-elektrische“ Organe nannte. Jetzt ist der wesentlichste Repräsentant der „pseudo-elektrischen“ Fische der *Mormyrus* zu den wirklich elektrischen verwiesen; und wenn seiner Zeit Hr. Babuchin⁹⁾, den Thatsachen vorgreifend, erklärte: „es giebt keine pseudo-elektrischen Fische, sondern nur große und starke sowie kleine und schwache elektrische Fische,“ so könnte er heutigen Tages diese Behauptung schon mit größerer Sicherheit aufstellen. Ferner aber öffnet sich gerade hier die Perspective, welche uns Aufschluß geben soll über das Räthsel der Entstehung solcher elektrischer Batterien in dem Thierkörper. Auch jetzt noch ist die eben citirte Behauptung, obwohl sie sehr wahrscheinlich vollkommen richtig ist, vom streng wissenschaftlichen Standpunkte aus als zu kategorisch gefaßt zu bezeichnen, da es Fische giebt, die den elektrischen verwandte Organe besitzen, von welchen aber bisher Entladungen in ganz vorwurfsfreier Weise nicht zu erzielen waren, oder es ist überhaupt keine Beobachtung über ihre elektrische Wirkung bekannt. Offenbar sind wir aber auf dem besten Wege, die Richtigkeit von Hrn. Babuchin's Behauptung zu erweisen, und dazu liefert die vergleichend-anatomische Betrachtung ausgezeichnetes Beweismaterial, indem sie den vollkommenen elektrischen Fischen die unvollkommen elektrischen ohne Schwierigkeit anzureihen vermag. Dabei ist vornehmlich an die Arten des Genus *Raja*, also die eigentlichen Rochen gedacht, welche wie der *Mormyrus* an beiden Seiten des Schwanzes Organe besitzen, deren Anordnung und Bau sich mehr oder weniger eng an den der elektrischen Organe anschließt. Höchst verdächtig wird der Rochen allerdings und zwar um so mehr, als ein anderer sehr merkwürdiger Nilfisch, der *Gymnarchus niloticus* in der Organisation des Schwanzes die Brücke bildet von der

Anordnung des Rochen zu derjenigen des Mormyrus, wo die elektrische Wirkung jetzt außer Zweifel steht. Der Gymnarchus, welcher im mittleren und oberen Nil häufiger ist, kommt höchstens im Sommer auch in den unteren Nil, und es findet sich daher die Gelegenheit, seine elektrische Natur festzustellen nur ausnahmsweise. Wie es scheint, liegen gar keine Beobachtungen am Lebenden vor.

Fig. 5.

Der Schwanz von *Mormyrus cyprinoides*. Die elektrischen Organe sind durch Ablösung der Haut bloßgelegt.

Hier bildet sich gleichsam vor unsern Augen eine Entwicklungsreihe, welche auf niedrigster Stufe die Gattung *Raja* zeigt, dann aufsteigend *Gymnarchus*, ferner *Mormyrus* und endlich *Gymnotus* sowie *Torpedo* anschließen läßt, der Ausgangspunkt aber, von dem diese stammesgeschichtliche Entwicklungsreihe der elektrischen Organe beginnt, sind Muskeln!!

Fig. 5 zeigt das Schwanzende des *Mormyrus*, wo die höchst zierlich angeordneten, platten Sehnen der Schwanzmuskeln,

welche im frischen Zustande durch ihren Perlmutterglanz an einen halbgeöffneten Damenfächer aus solchem Stoff im Kleinen erinnern, an einer gewissen Stelle, d. h. ungefähr dem Ende der Afterflosse benachbart, plötzlich ihre solide Fleischunterlage verlieren; sie spannen sich nun oberflächlich über eine durchscheinende, gallertige Masse hinweg, welche wiederum eine verhältnißmäßig grobe Plattenanordnung erkennen läßt, deren Stellung sich etwa senkrecht zur Hauptrichtung der Sehnenbündel verhält.

Die wenigen, locker aus Platten aufgebauten Säulen des Organs liegen hier also etwas schräg zur Längsaxe des Körpers und halten so die Richtung der benachbarten Muskelbündel noch einigermaßen ein, während sie beim *Gymnotus* fast ganz horizontal geworden sind.

Bei *Raja*, wo die „pseudo-elektrischen“ Organe ebenfalls der Schwanzmuskulatur angehören, ist nun endlich selbst die Plattenbildung unvollendet geblieben. Es finden sich hier in dem langgestreckten Organ Reihen von etwas abgeplatteten, rundlichen Körpern, eingebettet in eine gallertige Substanz, welche Körper schon bei Betrachtung mit bloßen Augen an etwas gequollene, fein zerzupfte Muskelbündel erinnern. Dies ist in der That keine Volta'sche Säule mehr, und man findet es unter Vergleichung mit den vorher besprochenen Organen gleichsam natürlich, daß so roh zusammengesetzte Apparate die hohe Leistungsfähigkeit der anderen nicht zeigen können, wie auch immer dieselbe zu Stande kommen mag.

Um so richtiger erscheint es gleichwohl, darauf hinzuweisen, daß Angaben von Beobachtern (*Robin*) vorliegen, welche auch hier gelegentlich durch Zuckungen des Froschschenkels und Ablenkung der Magnetnadel an besonders starken Exemplaren eine elektrische Wirkung der Organe beobachtet haben wollen¹⁰⁾. Wenn dies in

anderen Fällen trotz redlicher Bemühungen nicht glückte, so liegt dies vielleicht in der Ungunst lokaler und zeitlicher Verhältnisse, deren Berücksichtigung bei allen elektrischen Versuchen bekanntlich von besonders hervorragender Bedeutung ist. Man sollte dabei nicht vergessen, daß zuweilen ungünstige äußere Verhältnisse selbst den geschicktesten Experimentator mit erprobten, physikalischen Apparaten völlig in Verzweiflung setzen; sowie daß auch ein Streichholz nicht immer brennt, wie Hr. Brücke zu sagen pflegte.

Haben wir nun den Anfang des Ariadne-Fadens, der uns aus dem Labyrinth der mannichfaltigen, elektrischen Fischorgane herausführen soll, glücklich gefunden, so wird es schon leichter sein, demselben weiter zu folgen. Der ebenso interessante, wie schwierig zu untersuchende mikroskopische Bau der Organe wird weiter unten wenigstens in den Hauptpunkten Berücksichtigung finden, an dieser Stelle sei nur erwähnt, daß bei den Organen der lehterwähnten Gattungen bei Raja und Mormyrus selbst noch im entwickelten Zustand mit dem Mikroskop Spuren der Herkunft der Elemente von der Muskulatur nachweisbar sind, nämlich eine Schicht aus mäandrisch aufgerollten Fasern, welche die eigenthümliche Querstreifung zeigen, wie sie sich bei den Muskeln findet und ihnen die Bezeichnung der quergestreiften Muskulatur verschafft hat.

Steigen wir aber auf zu den voll entwickelten Organen der starken elektrischen Fische, zu Gymnotus und Torpedo, so fehlt hier auch im mikroskopischen Bilde der unmittelbare Hinweis auf die Entstehung der Batterien aus quergestreiften Muskeln. Auch bei diesen Gattungen kann indessen der Nachweis, daß ein gleiches Entwicklungsprincip vorliegt, mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit geführt werden. Der Weg dazu

ist nach der Natur der Sache ein doppelter: er folgt entweder der Entwicklung des Keimes, bewegt sich also auf embryologischer Basis, oder er folgt der Entwicklung des ganzen Stammes der Fische, stützt sich also auf Vergleichung der verwandten, nicht elektrischen Fischarten.

Zur Untersuchung der keimesgeschichtlichen Organentwicklung bot Torpedo das geeignetste Material, da dieser lebendgebärende Fisch seine Jungen bis zu einem bemerkenswerth weit vorgeschrittenen Stadium des Wachsthums bei sich trägt, so daß die jungen Fischchen, eben geboren, bereits etwa 6—8 cm lang sind und deutliche elektrische Schläge ertheilen können. Durch Eröffnung der mütterlichen Thiere gewinnt man also Embryonen des verschiedensten Alters, deren frische Untersuchung den Entwicklungsgang der Organe enthüllen mußte. Nach dem Italiener de Sanctis war es besonders Hr. Babuchin, welcher auf diesem Felde sich Vorbeeren errungen hat, indem er nachwies, daß in der That die Anfangsstadien der elektrischen Organe Elemente enthalten, die embryonalen Muskeln durchaus ähnlich und verwandt sind. Damit war der Beweis geliefert, daß die räthselhaften Batterien nicht in den Thierkörper, wie man sagt, hineingeschneit sind, sondern daß sie wirklich das Produkt einer eigenthümlichen Umwandlung ihm normal zukommender Organe darstellen.

Es lag auf der Hand, wie wichtig es sein mußte, die Richtigkeit der bei Torpedo festgestellten Thatsache auch an den Embryonen von Gymnotus zu erproben. Leider ist die Möglichkeit dazu vom Geschick bisher hartnäckig verweigert worden; nicht nur ist die Entwicklung der Brut bis heutigen Tages ein vollständiges Geheimniß der Natur, sondern selbst einigermaßen junge Individuen des Thieres sind noch nicht zur Beob-

achtung gelangt. Denjenigen meiner verehrten Leser, welche in dieser traurigen Sachlage vielleicht geneigt sind, einen besonderen Mangel an Energie oder Geschick der dabei interessirten, wissenschaftlichen Kreise zu sehen, möchte ich nur entgegen halten, daß selbst die Naturgeschichte unseres gemeinen Vales bekanntlich noch nicht vollkommen festgestellt ist, wenn wir auch hier in letzter Zeit wenigstens die junge Brut kennen gelernt haben; und das, was bei den günstigen Verhältnissen Europa's nicht glückte, bei den Schwierigkeiten eines uncivilisirten Landes unter tropischer Sonne noch weniger aussichtsvoll ist. Wahrscheinlich fällt die Entwicklung der jungen Zitteraale in die Regenzeit, und wenn dann die Lagunen und kleinen Wasserläufe (Caño's) der Planos weite, wogende Wasserflächen darstellen, treibt auch der eifrigste Forscher, ein betrübter Vohgerber, dem die Zitteraale weggeschwommen sind, auf hoffnungslosem Rachen über die schweigenden Fluthen, die ihre Kinder liebevoll verhüllen.

Während unter den gegebenen Verhältnissen die Aussichten auf baldige Lösung der Frage nach der Entwicklung dieses elektrischen Fisches äußerst geringe sind, so bleibt uns immer noch die Möglichkeit, den stammesgeschichtlichen Weg zu betreten.

Der leitende Grundgedanke bei derartiger Untersuchung ist, daß die gänzliche oder theilweise Umwandlung einer bestimmten Organanlage, die als ein allgemeines Attribut aller verwandten Organismen zu betrachten ist, in eine andere, davon abweichende für die ursprüngliche Anlage einen Verlust oder Ausfall bedingt. Dieser Ausfall kann freilich, besonders wenn er in sehr frühe Entwicklungsperioden des Organismus fällt, wieder so ausgeglichen und verdeckt werden, daß es schwierig oder selbst unmöglich wird, seine thatsächliche Existenz nachzuweisen: aber

andererseits ist ein positives Ergebniß solcher Untersuchung, also ein Nachweis des fortbestehenden Defektes an einer bestimmten Stelle der normalen Anlage beim entwickelten Thier ein nahezu ebenso bündiger Beweis der geschehenen Umwandlung, als die Verfolgung derselben auf keimesgeschichtlicher Grundlage.

In der That läßt sich nun bei allen den bisher genannten elektrischen Fischen der Ausfall eines Theiles der Muskulatur nachweisen; da ferner die elektrischen Organe sich an der Stelle des fehlenden Theiles und mit dem fortbestehenden in unmittelbarer Verbindung finden, so ist die Annahme gerechtfertigt, sie seien eben durch Verwandlung aus jenem hervorgegangen.

Natürlich braucht es nicht immer der nämliche Abschnitt der Muskulatur zu sein, welcher der Umwandlung verfällt, und ist es auch thatsächlich nicht; eine allgemein geltende Beschränkung würde nur sein, daß der in Wegfall kommende Theil der Muskeln für die Erhaltung des Lebens entbehrt werden kann, wenn der Verlust auch nicht ohne Einwirkung auf die Lebensweise bleibt. So fehlt dem gemeinen Rochen ein Stück der langen Seitenmuskeln des Schwanzabschnittes, desgleichen bei dem Gymnarchus, wo es in höchst merkwürdiger Weise aus dem centralen Theil der Seitenmuskeln ausgeschnitten erscheint; beim Mormyrus sind die der Seitenlinie benachbarten Theile der nämlichen Muskeln am Schwanz bis auf die Sehnen verloren gegangen; dem Gymnotus fehlt die tiefste Partie der ventralen Rumpfmuskulatur bis auf einen kleinen Rest, die sogenannte Zwischenmuskelschicht, und ist an ihrer Stelle das große elektrische Organ getreten; es fehlt ihm ferner der oberste Theil der inneren Flossenträgermuskeln, wo sich das kleine elektrische Organ entwickelt hat; der Torpedo endlich fehlt die äußere Lage der kleinen Muskeln des Kiemengerüstes und die bei den ver-

wandten Rochen außerordentlich mächtigen, äußeren Kiefermuskeln!

In allen Fällen zeigt besonders das Verhalten der sehnigen Theile, welche einst den Muskeln zur Umhüllung und Anheftung dienten, an den elektrischen Organen noch die Andeutung der früheren Organisation und erlaubt weit gehende Vergleichen mit den entsprechenden Anlagen der nicht elektrischen Verwandten.

Es wurde bereits bemerkt, daß die Umwandlung bestimmter Muskelanlagen sehr wohl einen gewissen Einfluß auf die Lebensweise der Thiere haben könnte; in dieser Beziehung ist die bedeutungsvolle Thatsache hervorzuheben, daß sich alle elektrischen Fische durch Trägheit auszeichnen. Langsam und schwerfällig vollziehen sich die Bewegungen der gewöhnlich auf dem schlammigen Grunde ruhenden Zitterrochen, schiebt sich der Zitteraal durch die undulirende Bauchflosse in dem flachen Wasser dahin; und auch der Nilhecht läßt die lange Rückenflosse unduliren, während sein mit elektrischen Organen ausgestatteter Schwanz der Bewegung verhältnißmäßig wenig nutzbar wird. Die Trägheit der Zitterrochen geht thatsächlich bis zur Erkrankung derselben; wenigstens weiß ich mir nicht anders als durch die träge Lebensweise zu erklären, daß gerade diese Art von einer eigenthümlichen Krankheit befallen wird, bei welcher sich die Glieder der Brustflossen nekrotisch abstoßen, und der Körper unförmlich anschwillt, wie es bei der Elephantiasis des Menschen der Fall ist.

Die elektrischen Fische haben es eben nicht mehr nöthig, sich besonders um ihr tägliches Brod zu bemühen, der Tisch ist für sie reichlich gedeckt, auch wenn sie keinen Muskel darum rühren. Die furchtbare Waffe, welche sich in ihrem Körper herangebildet hat, befähigt sie zur Bewältigung von Beutestücken, wie sie

ohne ernstern Kampf durch die gewöhnlichen Mittel nicht bezwungen werden könnten. Beispielsweise schnitt ich aus dem Magen einer *Torpedo panthera* des rothen Meeres, deren Gewicht 420 g betrug, einen noch wohl erhaltenen Fisch (*Pagrus*) von 53 g Gewicht! Dabei ist die Breite der Mundspalte nur 25 cm, die Breite des verschlungenen Fisches aber 48 cm, so daß er durch den dehnbaren Kieferapparat, wie bei einer Riesenschlange hinabgewürgt worden sein muß.

Nach Dr. Sachs's Angaben räumen die *Tembladores* des südlichen Amerika's unwiderstehlich in den heimischen Gewässern auf und verschlingen ebenfalls Alles, was ihre Nähe nicht zu fliehen vermag, bis nur die elektrischen Fische selbst übrig geblieben sind, da sie sich gegenseitig Nichts anhaben.

Das kleine, nicht dehnbare Mäulchen des *Mormyrus* würde keinesfalls größere Beute passiren lassen, aber sehr wohl können kleine Süßwasser-Crustaceen, Wasser-Insekten und Würmer, die flüchtig genug sind, um dem langsamen Fischchen zu entgehen, auch durch einen verhältnißmäßig schwachen elektrischen Schlag zahm gemacht und nach Behagen durch die enge Mundöffnung hinabgeschlurft werden, sei es daß die abwärts gebogene Schnauze sie aus dem Schlamm des Bodens aufliest, sei es daß der nach oben gerichtete Mund solche von schwimmenden Gegenständen oder Wasserpflanzen abstreift.

Gerade der unvollkommenste, noch zweifelhaft elektrische Fisch, das Genus *Raja*, giebt allerdings keinen plausibeln Anhalt für die Function des Schwanzorgan's, da die zu ihm gehörigen Arten ganz ansehnliche Beute durch die Macht ihres Gebisses und der Kiefermuskeln bewältigen. Andererseits verlieren sie aber auch wenig durch den Verlust der kräftigen Muskelaction ihres Schwanzes, welcher gegenüber den breiten, der Locomotion fast

ausschließlich dienenden Brustflossen nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt. —

So baut sich eine stattliche Reihe interessanter Thatsachen auf, welche harmonisch zusammenklingen und auch denjenigen mit unwiderstehlicher Gewalt zum Versuch einer allgemein gültigen Deutung zwingen, der die lebendige Beobachtung aus innerster Ueberzeugung hoch über jedwede Speculation stellt. Es handelt sich darum, was unsere Naturschauung, ins Besondere die Entwicklungslehre, aus den soeben angeführten Thatsachen verwerthen kann und in welcher Richtung uns darauf zu gründende Schlußfolgerungen führen? Um diesen Fragen näher zu treten wird es nothwendig sein, einige erklärende Bemerkungen voraus zu schicken.

Nur der Enthusiast kann sich der Ueberzeugung verschließen daß sich der Entwicklungslehre, dieser Theorie, welche man das „Enfant chéri“ unseres Zeitalters nennen könnte, an vielen Stellen der Naturbetrachtung noch ungeheure Schwierigkeiten entgegenbauen, und häufig genug die blasse Phrase es versucht unausfüllbare Abgründe zu überbrücken. Unter diesen Schwierigkeiten ist schon von Darwin selbst den elektrischen Organen der Fische ein hervorragender Platz angewiesen worden und auch Hr. du Bois-Reymond hat wiederholentlich betont, daß die Entstehung derselben im Sinne der Selectionstheorie recht bedeutenden Bedenken unterliegt. Diese Ueberzeugung der genannten Forscher basirt auf dem Gedanken, daß nur ein fertiges Organ Schläge zu ertheilen vermag, nur ein solches also dem Thier wirklich Nutzen schaffen kann, und ein sich bildendes als unnütz somit nicht Gegenstand der natürlichen Zuchtwahl werden könne.

Ich gestehe, daß ich auch ohne unjere neueren Fortschritte in der Erkenntniß der elektrischen Organe in Rechnung zu stellen,

die Schwierigkeit der Erklärung hier nicht größer fand als leider an vielen andern Stellen der organischen Natur, wo sich Einrichtungen von wunderbarer Pracht und Zierlichkeit finden, deren Nutzen für das Individuum mehr als zweifelhaft ist. Häufig genug erscheinen solche eigenthümliche Gaben der Natur den Organismen als wahre Danaergeschenke verliehen, welche ihnen leicht zu Schaden und Untergang gereichen; oder sie sind lästige Anhänge, welche besten Falles als indifferent für das Individuum betrachtet werden können. Man erkläre doch den Nutzen jener sonderbaren Schnüre an dem wurmförmigen Körper einer Chirodota, welche mit Tausenden mikroskopischer Nädchen behängt sind, oder der für den schleimigen Körper übergewaltigen Kieselgerüste mancher Radiolarien, welche hier als Andreaskreuze, dort als Ordenssterne und Sonnen sich ausbilden, während andere unter gleichen Bedingungen lebende Verwandte derselben Nichts davon zeigen! Wenn Anlockungsfärbung Nutzen schafft, so ist damit noch nicht begreiflich gemacht, warum Zeichnung und Färbung von Tausenden der Arten von Gliederführern streng durchgeführte Muster aufweisen, welche nach bestimmten Vorbildern construiert scheinen und in ihrem gefährlichen Glanz auch die Feinde des Trägers derselben aus weiter Ferne herbeilocken. Häufig enthüllt erst das Mikroskop die volle Schönheit und Regelmäßigkeit der Muster und doch sollen sie, niedrig organisirten Sinnen zu gefallen, in ihrer wunderbaren Pracht organisirt worden sein! Durch solche Betrachtungen hat sich bei mir die Ueberzeugung ausgebildet, daß es unberechtigt ist, zur Erklärung solcher Bildungen den Begriff „Nutzen“ in dem engen, vom Menschen gebildeten Sinne zu verwerthen, sondern daß die Bildungs- und Wachsthumsgesetze der Natur noch anderen, bestimmenden Momenten gehorchen als allein dem Nutzen nach

grober, menschlicher Anschauung, ebenso wie etwa unsere menschliche Moral im Getriebe der organisirten Welt auch nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Wenn in der Entwicklung aus einer Zelle zunächst durch Theilung zwei werden, so ist es nicht der Nutzen, welcher die Zelle veranlaßt sich zu theilen, sondern das der Zelle zukommende Wachsthum über die natürliche Grenzen veranlaßt sie zur Vermehrung; auch als einzelne Zelle könnte sie ja, wie Millionen ihrer Schicksalschwesteren lehren, die nie über dies Stadium hinaus gelangen, eine ganz erträgliche Existenz führen; bilden sich so aus dem Elementarorganismus durch weiter gehende Zellvermehrung Zellhaufen, ohne daß ein Vortheil im Kampf um's Dasein dazu die Veranlassung zu sein brauchte, so muß es auch als möglich zugegeben werden, daß durch ungleichmäßige Zellwucherung indifferente Anhänge entstehen. Durch eigenthümliche Ernährungs- und Wachsthum-Verhältnisse des Organismus höherer Ordnung mag sich gelegentlich eine so abweichende Wucherung herausbilden, daß dieselbe mit einem trivialen Namen als Auswuchs bezeichnet werden und dem Mutterorganismus zum lästigen Ballast gereichen könnte. Während nun manche der indifferenten Anhänge als Ruder, Kiemen u. s. w. Nutzen im Sinne des Menschen schaffen und so Gegenstand der natürlichen Zuchtwahl werden, wodurch damit begabte Arten vor den übrigen einen unleugbaren Vortheil im Kampf um's Dasein gewinnen, ist andererseits doch nicht ausgeschlossen, daß die Wachsthumsvorgänge auch fernerhin indifferente, oder im menschlichen Sinne selbst schädliche Wucherungen entstehen lassen können, wenn nur das Dasein der Art dadurch nicht allzu schwer bedroht wird. So wartet das menschliche Geschlecht ungezählte Jahrtausende schmerz-

lich auf das Verschwinden des sogenannten wurmförmigen Fortsatzes an unserem Darmkanal, der Vielen Ursache eines vorzeitigen Todes wird.

Diese mannigfachen, noch unergründeten Beziehungen der einzelnen Theile eines Organismus höherer Ordnung zu einander und des Gesamtorganismus zu seiner Umgebung, welche von Cuvier als die Gesetze der Correlation bezeichnet wurden, haben, wie Darwin¹¹⁾ selbst ausführte, mit der natürlichen Zuchtwahl und dem diese beherrschenden Nutzen direkt Nichts zu schaffen; ihre Bedeutung wurde aber von ihm, eben weil sie seiner Lieblingstheorie fremd waren, unterschätzt. Als üble Folge dieser Einseitigkeit ergeben sich dann verfehlte Versuche Merkmale der Organismen als Errungenschaften der natürlichen Zuchtwahl nach den Principien des menschlichen Begriffes „Nutzen“ zu erklären, welche nur unter dem Gesichtspunkt der Correlation verständlich werden dürften. So sind nun und nimmermehr die riesenhaften, hörnerähnlichen Anhänge des männlichen Kopfes und Brustschildes vieler Käferarten Waffen, welche die Thiere nützlich verwerthen könnten; selbst bei den Hirschen und Rehen spielen sie als Waffen nur eine untergeordnete Rolle, und sind gerade die stärksten und schwersten Geweihe den Thieren recht lästig, während der einfache Spieß des jugendlichen Männchens, kräftig geführt, unstreitig die gewaltigste Wirkung hätte. Bekämpft doch die Dryx-Antilope Afrika's selbst den Löwen ihrer heimathlichen Steppen mit Erfolg durch die einfachen, sanft gebogenen Spieße auf ihrem Kopfe! Gerade hier bei den geweihtragenden Thieren gewinnen wir aber einen Einblick in die Entstehung der wunderbaren Bildung unter Berücksichtigung der Correlation, in welcher die Geweihwucherung mit der regelmäßigen Periode der Geschlechtsfunctionen als zeitweise Ableitung

der Säfte steht und sehen monströse Geweihe entstehen, wenn eine Verletzung der Genitalorgane deren Function stört.

Diese noch räthselhafte Abhängigkeit der Organe von einander liegt im Organismus so tief begründet wie seine Entwicklungsfähigkeit überhaupt und ruht unzweifelhaft auf physiologischer Basis. So lange die Richtung, welche diese Entwicklung nimmt, das Individuum nicht in unlöslichen Widerspruch mit seinen Existenzbedingungen setzt, wird es dieselbe fortsetzen können, auch wenn die Resultate der Entwicklung ihm nicht in allen Theilen vortheilhaft sind. Gewiß sind innere, zwingende Gründe vorhanden, daß die Systeme des Körpers sich in ihrem Wachsthum und Entwicklung auf einander einrichten, daß sie sich den Verhältnissen ihrer Umgebung anpassen, und die Fortbildung der Art beweist, daß diese Gründe im allgemeinen Haushalt der Natur nicht unzweckmäßig wirken. Damit ist aber noch nicht bewiesen, daß der Nutzen das allein leitende Princip ist und die darauf basirte natürliche Zuchtwahl allein die Umgestaltung leitet. Können doch für das Individuum positiv schädliche Einrichtungen sich mit der allgemeinen Zweckmäßigkeit der Natur sehr wohl vertragen; denn auch aus dem Tode blüht neues Leben. Ich erinnere nur an den sicheren Untergang der Männchen vieler niederen Thiere durch die Begattung, der Weibchen durch die Entwicklung der Brut; vielleicht bleibt uns der wurmförmige Fortsatz auch, um einen nothwendigen Verteilungsfactor gegen die zu schnelle und starke Ausbreitung des Menschengeschlechtes zu geben. Die Gesetze der Correlation sind unabhängig von der natürlichen Zuchtwahl Darwin's, aber ebenso wie Lebensweise und Klima mächtige Factoren für die Umgestaltung der Arten. —

Der geehrte Leser möge diese kleine Abweichung vom Thema

verzeihen, da dieselbe zum Verständniß des Nachfolgenden unerläßlich schien. Gerade in der Organisation der elektrischen Fische ist nämlich das Walten der Correlation zwischen den verschiedenen Organen ein höchst merkwürdiges, und würde ich nie zugeben können, daß z. B. der elektrische Rochen, abgesehen von seinen elektrischen Organen, „ein ganz gewöhnlicher Rochen“ sei. Nur bei den elektrischen Rochen verlängern sich die Knorpel des Schultergerüsts und lehnen sich an entsprechende Verlängerungen der Kopfnorpel, um einen festen Rahmen für die arten, elektrischen Organe zu bilden; die Brustflossen reduciren sich im Vergleich mit anderen Rochen etwa bis auf die Hälfte ihrer Breite, die Mundspalte verengt sich; die Zähne bilden sich zurück, bis sie bei manchen Gattungen, z. B. Narcine, nur noch eine bandförmige rauhe Bekleidung der Kiefer darstellen; das Nervensystem entwickelt bestimmte Centren peripherischer Nerven zu elektrischen Lappen: Alles dies sind Zeichen des allmählichen Schaffens der Correlation zwischen den Organen, deren Resultat die vollendete Form ist, wie sie uns als Zitterrochen vorliegt. Wir können nun, auf die gewonnenen Thatsachen gestützt, versuchen, einen Einblick in die geheimnißvolle Werkstätte der Natur zu thun, und das Werden der elektrischen Fische wenigstens aus bescheidener Ferne zu belauschen.

Als Ausgangspunkt bietet sich plausibel genug die Annahme dar, daß bestimmte Fische die Anlage zu einer eigenthümlichen Umformung ihres Muskelsystems in sich tragen, so daß die Muskeln unter Verlust ihrer contractilen Substanz und somit ihrer eigentlichen Function unter Quellungsercheinungen in einen Zustand übergeführt werden, wo eine neue Ordnung der beweglich werdenden kleinsten Theilchen möglich ist. Ob dann die beginnende Umformung die Fische zu träger Lebensweise veranlaßt,

oder umgekehrt das Versinken in träge Lebensweise die Umformung einleitet? ist der Natur der Sache nach nicht wohl festzustellen, und für die vorliegende Frage kaum von Bedeutung.

Die langen undulirenden Flossen, welche von Flossenträgermuskeln, dem Hautsystem und nicht der Skelettmuskulatur zugehörig, bewegt werden, treten an Stelle der kräftigen Action durch die mächtige Schwanzmuskulatur anderer Fische. So ist es bei dem *Gymnotus* der Fall, bei *Mormyrus*, bei den Rochen; gerade bei den Letzteren ist auch in den nichtelektrischen Arten wie *Myliobatis*, *Trygon* der Schwanz als Bewegungsorgan fast gänzlich aufgegeben und hängt peitschenartig, ein „nußloses“ Glied an dem durch mächtige Brustflossen bewegten Körper. Hier ist also vortreffliches Material vorhanden, um Theile, die durch Nichtgebrauch der Entartung verfallen, in anderer Weise wieder nutzbar zu machen; jedenfalls ist die so entstehende Schwächung der Muskelaction für die Thiere kein hinreichender Grund im Kampf um's Dasein zu unterliegen, wie ein Blick auf die florirenden Genera *Myliobatis*, *Trygon* u. zeigt.

Die Beobachtungen haben ferner gezeigt, daß bei den eintretenden Quellungsvorgängen in den Muskeln die zugehörigen Nerven nicht zu Grunde gehen, sondern daß im Gegentheil ihre Endigungen, plattenförmig ausgebreitet, im Vergleich mit dem normalen Muskel eine enorme Mächtigkeit erlangen und diese Mächtigkeit sich auf die Stämme selbst und die centralen Ursprungstätten der Nerven fortsetzt.

Wir wissen nun außerdem durch die bahnbrechenden Untersuchungen des Hrn. du Bois-Reymond, daß sich im lebenden Muskel und Nerven nachweisbare elektrische Ströme entwickeln, welche bei der Wirkung von Nerv auf Muskel bestimmten Mo-

dificationen unterliegen. Für die elektrischen Organe nun finden wir die Contactflächen der Nerven mit dem modificirten Endapparat außerordentlich vermehrt, eine Steigerung der durch das Nervenprincip hervorgerufenen elektrischen Wirkung in denselben erscheint daher begreiflich, wie auch immer dieselbe physikalisch zu Stande kommen mag. Nehmen wir nun an, daß ein Fisch, an welchem die beginnende Muskelumformung einen gewissen Grad erreicht hat, in recht ausgeruhtem Zustande unter sonst günstigen Umständen plötzlich von einem nahenden Feind irritirt wird oder eine nahende Beute bemerkt, so wird es denkbar, daß er, energisch sein Muskelssystem innervirend, in dem modificirten Theil Ströme hervorrufft, welche stark genug sind, um nach Außen fühlbar zu werden.

Wird dadurch anfänglich auch nur ein schwacher Effect durch Erschrecken des Feindes oder der Beute erreicht, so kann sich doch auf diese Weise der Fisch der in ihm schlummernden Kraft soweit bewußt werden, daß er allmählich schlagen lernt, wie beispielsweise selbst im Menschen die Fähigkeit zu bestimmten Kraftäußerungen und eigenthümlich combinirten Bewegungen schlummert, die nach der Erkenntniß der Möglichkeit ausgebildet werden können.

Ist ein elektrischer Fisch, der in solchem Stadium den sogenannten unvollkommen elektrischen entsprechen würde, soweit in seiner Organentwicklung gelangt, so wird sich nunmehr allerdings für ihn auch ein Vortheil im Kampf um's Dasein aus solchem Functionswechsel von Muskel in Organ ergeben; die natürliche Zuchtwahl kann sich des erlangten Vortheils bemächtigen und ihn accumulirend in langer Reihe von Generationen zu einer erstaunlichen Höhe der Vollkommenheit bringen, während

sich auch die nicht direkt beteiligten Systeme des Körpers ebenfalls correlativ umbilden werden.

Es schwächt alsdann die Natur in steigendem Verhältniß die gewöhnlichen, ursprünglichen Waffen der Arten, welche sie in ihrer Muskelaction und den Beißwerkzeugen führten, um eine andere, soviel furchtbarere Waffe, die Electricität, an die Stelle derselben zu setzen.

Doch wir haben, wie es scheint, ein wichtiges Thier, den Donnerer des Nils, gemeinhin Zitterwels genannt, in unserer Darstellung völlig vergessen! — Nicht so ganz, nur scheint es unabweisbar, ihm eine besondere Stellung einzuräumen.

Der Zitterwels (*Malopterurus electricus*, Fig. 6) ist nach seinem Außern ein gar stattlicher Herr, wie das Pfäfflein der Bürgerlichen Ballade; sein Bäuchlein rundet sich gewaltig, und selbst bis an Stirn und Auge dehnt sich die speckige Schwarte, die den Fisch umhüllt. Um das Maul ordnen sich die wurmförmigen, lockenden Anhänge, mit denen er wie die anderen gefräßigen Verwandten die Beute ködert. Aber während die übrigen Welse den weit gespaltenen Rachen des Raubfisches zeigen, thut dieser Duckmäuser, als wäre er der friedlichste Bewohner dieser Welt, der das mit kleinen Zähnen bewaffnete Maul kaum zu öffnen wagte. Wie die bereits besprochenen Elektriker hält auch der Zitterwels nicht viel von körperlicher Anstrengung, er liegt ruhig versteckt in Löchern des schlammigen Ufers, unter Steinen und zufällig ins Wasser geworfenen Gegenständen, bis ihm sein tägliches Brot bescheert wird. Was wird er sich unnöthig in Mühe und Aufregung stürzen! Die mächtigen Bannstrahlen, welche der Fisch nach allen Seiten auszusenden versteht, wirken vernichtend auf die lebenden Wesen, gegen die sein Zorn sich wen-

Fig. 6.

Malopterus electricus. (Bitterwels.) Seitenansicht.

det, und bringen sie mühelos in seine Gewalt. Ein nur 14 cm langer Zitterwels, der von seinem Besitzer unvorsichtiger Weise in ein von zahlreichen Fischen bevölkertes Zimmer-Aquarium gesetzt wurde, tödtete sofort seine sämtlichen Mitgefangenen, Groß und Klein. Die Rückenflosse des Zitterwelses ist in eine Fettflosse verwandelt, die Brust- und Bauchflossen sind nur von geringer Größe; eine kleine Afterflosse und ein nur mäßig entwickelter Schwanz vervollständigen den offenbar schwächlichen Bewegungsapparat.

Wodurch das behäbige, wohlgenährte Aussehen des Fisches hervorgerufen wird, läßt sich durch die Betrachtung des Querschnittes (Fig. 7) leicht feststellen; derselbe lehrt, daß der Gesamt-

Fig. 7.

Senkrechter Durchschnitt des Schwanzes von *Malopterus electricus*.

rumpfd es Thieres äußerst locker in eine Art von Futteral eingefügt ist, welches aus einer gallertigen Masse von beträchtlicher Dicke und durchscheinender, hell graugelblicher Farbe besteht, die

fest und unzertrennlich mit der Haut verbunden ist, während gegen die Unterlage eine sehnige Schicht den Abschluß bildet. Da letztere nur durch ein schleimiges, flockiges Gewebe, die sogenannte Rudolphi'sche Haut, mit den tieferen Theilen verbunden ist, so zieht sich die ganze speckige Schwarte sehr leicht von dem Fisch ab und schlüpfen querdurchschnittene Stücke häufig von selbst aus der Umhüllung.

Schon das äußere Ansehen würde, wenn man die anderen elektrischen Fische vergleicht, die Ueberzeugung erwecken, daß es gerade diese der Haut anhaftende gallertige Substanz ist, welche die Trägerin der elektrischen Kraft abgiebt, und diese Vermuthung wird durch das nähere Untersuchen derselben zur Gewißheit. Aber ein Hauptunterschied von den bereits betrachteten elektrischen Organen fällt sofort in die Augen: es fehlt dem Bitterwelsorgan irgend welcher Aufbau der elektrischen Elemente, wie er bei *Torpedo* als hochgestellte, bei *Gymnotus* als horizontal lagernde Säulenordnung sich bemerkbar macht, wie ihn die schräge Plattenstellungen des *Mormyrus* und selbst die reihenförmigen Anordnungen der abgeplatteten Klümpchen beim gewöhnlichen Rochen erkennen lassen.

Hier müssen wir, um mehr zu sehen, unmittelbar das Mikroskop zur Hilfe nehmen, und bemerken alsdann, daß die Masse aus flachen, kuchenförmigen Scheiben zusammengesetzt ist, welche wie die Beeren einer Traube an den Verzweigungen eines mächtigen Nerven hängen, der an beiden Seiten des Körpers unter dem Organ vom Nacken her nach hinten zieht. Die flachen Kuchen drängen sich in ungeheurer Zahl, quer zur Hauptaxe des Fisches geordnet, aneinander und zeigen im mikroskopischen Bilde in sofern eine Art von Aufbau, als die einzelnen

Ruchen sich um den halben Durchmesser gegen einander verschieben; nur bei alten Thieren ist eine bindewebige Zwischensubstanz deutlich entwickelt, welche Fächer in Gestalt von niedrigen Doppelpyramiden für die elektrischen Scheiben darstellt, auf dem Querschnitt also wegen der durchschnittenen Fächer eine rautenförmige Zeichnung erkennen läßt.

In der That scheint diese Anordnung überhaupt nur ein möglichst dichtes Deplacement der Elemente sowie eine Erleichterung des Zutritts der Nervenverzweigungen zu den einzelnen Scheiben zu bezwecken. Diese fügen sich nämlich an stielähnliche Verlängerungen der elektrischen Scheiben, etwa wie die Ranke an den dünnen Hals eines unten platten Flaschenkürbisses, und drängen sich von hinten her zwischen den Rändern benachbarter Scheiben hindurch, um den Stiel der davor liegenden zu erreichen; hier verbindet sich nun die nervöse Faser ohne deutliche Grenze mit der feinkörnigen, kernhaltigen Inhaltsmasse der Scheiben, die sich durch stärkere Anhäufung um den Stielansatz in der Mitte kraterartig wulstet.

Höchst merkwürdig ist auch der Ursprung und Verlauf des zugehörigen Nerven der Organe; denn dieser, obgleich von erheblicher Dicke, stellt in der That eine einzige Faser dar, welche unter fortgesetzter, unendlich oft sich wiederholender Theilung doch nicht wesentlich schwächer wird, sondern dabei stets an Ausdehnung im Gesamtquerschnitt aller Aeste gewinnt. Die eine Faser kommt auch von einem einzigen Centralursprung, d. h. einer, allerdings kolossal großen Ganglienzelle, welche im obersten Theil des Rückenmarks ihren Sitz hat.

Ist so der Sitz, die Ausbildung, Anordnung der Elemente, Art der Innervation, und der zugehörige centrale Ursprung durchaus verschieden von allen bisher besprochenen elektrischen

Organen, erübrigt es nur noch zu betonen, daß auch die Function derselben principielle Unterschiede zeigt, um aus vollster Ueberzeugung erklären zu dürfen: Die elektrischen Organe des Zitterwelses sind auf einem anderen Boden gewachsen als die übrigen als muskuläre Organe bezeichneten.

Die principiellen Unterschiede der Function beruhen nämlich darauf, daß sonst bei den elektrischen Organen der Strom stets von der Seite des Nervenansatzes an das Element durch dasselbe weiter aufsteigt, also an denjenigen des Zitterrochen vom Bauch zum Rücken, des Gymnotus vom Schwanz gegen das Kopfende; der Rücken, beziehungsweise der Kopf sich somit positiv gegen den Bauch oder den Schwanz verhält (Pacini'sche Regel). Der Zitterwels übernimmt es in diesem Falle das Sprichwort zu bewahrheiten, daß keine Regel ohne Ausnahme sei; denn obwohl bei ihm (wie bei Gymnotus) die Nervenästchen von der Schwanzseite zu den Elementen treten, verläuft der Strom hier im Organ gegen die Nervenansätze gerichtet, also vom Kopf zum Schwanz, welcher letzterer daher das positive Zeichen zu beanspruchen hat.

Wenn es nun aber beim Zitterwels keine Muskeln sind, die das Material zum Aufbau der elektrischen Organe herzugeben hatten, wenn selbst der sogenannte Hautmuskelschlauch der Fische sich unversehrt unter seinem Organ vorfindet, was bleibt denn noch zur Verfügung, um sich in entsprechender Weise verwandeln zu lassen?

Auch hier bieten sich physiologische Thatsachen dar, welche die Fingerzeige für die zukünftige Lösung des noch in vieler Beziehung dunklen Problem's an die Hand geben. Außer den Muskeln und Nerven sind es die Drüsen, in denen elektromotorische Kräfte thätig werden; finden sich keine Muskeln in der Haut, welche die Unterlage oder den Ausgangspunkt für die elektrischen

Organe abgeben konnten, so werden es also vielleicht Drüsen gewesen sein.

In der That fehlen nun aber der Haut des Zitterwelses nicht nur die Muskeln, sondern auch die Drüsen, wie solche in der Haut höherer Wirbelthierklassen stark entwickelt sind; dagegen ist die Haut mit einem erstaunlichen Reichthum einzeln stehender, drüsiger Zellen ausgestattet. Daß diese einzelnen, eigenthümlich entwickelten großen Zellen der Fischhaut einzelligen Hautdrüsen der Amphibien gleichwerthig zu erachten sind, darüber sind die meisten vergleichenden Anatomen einig, und da selbst der mikroskopische Bau zwischen diesen sogenannten Schleimzellen und den elektrischen Elementen bedeutende Punkte der Vergleichung darbietet, muß ich in ihnen den Ausgangspunkt der sich bildenden elektrischen Organe vermuthen. Werden die Schleimzellen als drüsenartig oder „adenoïd“ bezeichnet, so darf man auch die Organe, welche ihnen ihre Entstehung verdanken, mit dem gleichen Namen belegen. Die Untersuchungen führen also dazu den muskulären elektrischen Organen eine zweite Kategorie als adenoïde elektrische Organe an die Seite zu stellen.

Auch hier drängt sich wieder alsbald die berechtigte Frage in den Vordergrund: Wie findet man die Verhältnisse bei dem sich entwickelnden Zitterwels? Und wieder muß mit Betrübniß im lieben Gemüthe eingestanden werden, daß noch kein Forscher so glücklich war, seine Hand an die sich entwickelnde Brut des Fisches zu legen. Da dies großer Wahrscheinlichkeit nach auch nicht zu bald gelingen dürfte, so möge es vergönnt sein, sich davon ein Bild zu machen, wie die Theile an dem foetalen Zitterwels etwa aussehen werden — natürlich: Irrthum vorbehalten!

Ich habe durch die Untersuchung jugendlicher Organe des Fisches die Ueberzeugung gewonnen, daß die Erwartungen, welche man auf die zukünftige Untersuchung der noch zu findenden Brut setzt, in mancher Beziehung getäuscht werden dürften, d. h. das Mikroskop wird Bilder von erstaunlicher Einfachheit aufweisen. Sind schon beim jugendlichen Zitterwels die elektrischen Elemente nur gleichsam locker an einander gepackt, so wird dies beim Embryo noch ausgesprochenener der Fall sein; die Elemente werden sich denen des erwachsenen Fisches immer unähnlicher zeigen bis zu einem Stadium, wo die tiefer in den Hautschichten befindlichen Zelllagen, welche elektrische Elemente werden sollen, sich allein durch die beginnende Abgrenzung gegen die oberflächlichen Zellen, etwas bedeutendere Größe, lebhaftere Kernvermehrung und beginnende Abplattung von letzteren unterscheiden lassen.

Da das in der Lederhaut stärkere Bindegewebe, welches sich beim entwickelten Organ wie eine feste Barriere zwischen die elektrischen Elemente und epithelialen Lagen der Haut einschaltet, überhaupt erst spät zu stärkerer Ausbildung kommt, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn man es dereinst beim Embryo fast gänzlich vermißt. Die zu elektrischen Riesenzellen werdenden Elemente haben sich in solchem Entwicklungsstadium von ihren Verwandten, den späteren Schleimzellen noch kaum losgesagt, und kein trennendes Glied schiebt sich zwischen beide Anlagen ein. Ihre tiefe Lage mag schon genügen, um sie ihrer ursprünglichen Function zu entfremden und der Umwandlung verfallen zu lassen; sind doch die oberflächlichen noch reichlich genug bemessen! Die Einschaltung der bindegewebigen Züge zwischen die nunmehr abweichenden Zielen zustrebenden Elemente muß dieselben auch unter besondere Ernährungsverhältnisse bringen und mag die

progressive Fortbildung der abgesonderten zu einer hypertrophischen Zellform erleichtern. Damit geht alsdann die Entwicklung der zugehörigen Nervenästchen in ihrer bemerkenswerthen Reichhaltigkeit einher und versieht die elektrischen Elemente so kräftig, daß die Wirkung der elektrischen Schläge sich schon an jungen Thieren recht deutlich bemerkbar macht.

Wenn bereits oben bei Besprechung der Zitterrochen-Organen die Vergleichung der elektrischen Säulen mit Volta'schen Säulen trotz der verlockenden Ähnlichkeit des Bildes (zumal die Organplatten bei der mikroskopischen Untersuchung sich aus zwei Schichten, einer unteren nervösen und oberen bindegewebigen, zusammengesetzt erweisen) als trügerisch zurückgewiesen wurde, so verliert solche Vergleichung beim Zitterwels erst recht jeden Halt.

Hier findet sich, soviel wir wissen, nur einerlei Substanz, die feinkörnige, mit Sternzellen durchsetzte Masse der elektrischen Scheiben, allseitig umgrenzt von einer wahrscheinlich porösen Grenzschicht; beim Zitteraal ist also eine Volta'sche Säule sicherlich nicht ohne Weiteres erkennbar, und man muß suchen auf andere Weise der Sache näher zu kommen, um Einblicke in das geheimnißvolle Gebiet zu gewinnen, wo es sich um die zweite so hochwichtige Frage, nach der Wirkung des Nerven auf die Endorgane und die Beziehung dieser Wirkung zur freierwerbenden Electricität handelt.

Sind es also nicht zweierlei, durch die optische Untersuchung unmittelbar festzustellende Substanzen, welche in den Organen als Elektromotoren wirken, so ist doch damit nicht gesagt, das Princip der Volta'schen Säule sei überhaupt unanwendbar, wo es sich um eine Erklärung für das Zustandekommen des elektrischen Schlages durch den Willensimpuls des Thieres handelt. Die physikalischen Grundlagen dieser Theorien, ge-

mein hin „Entladungstheorien“, zu erörtern, würde dem Zweck dieser Blätter nicht entsprechen, zumal eine Einigung darüber, welche derselben die Thatsachen am besten erklärt, bisher nicht erzielt werden konnte. Soviel läßt sich aber gewiß vertreten, daß, wenn eine gröbere Anordnung elektromotorischer Gegensätze im Organ nicht nachzuweisen ist, sehr wahrscheinlich eine feinere derartige Anordnung vorhanden sein wird, welche nach ähnlichen physikalischen Gesetzen wirkt, wie es die gewöhnliche, experimentell festgestellte im künstlichen Apparat leistet.

Als einen bildlichen Ausdruck solcher feineren elektromotorischen Anordnung hat Hr. du Bois-Reymond im Nerv und Muskel wie im elektrischen Organ kleinste Körperchen angenommen, welche die elektrischen Gegensätze in polarer Vereinigung enthalten, also, wie man es nennt, dipolar sind. Lange Reihen mühsamster und sorgfältigster Beobachtungen haben ihm den Beweis geliefert, daß die Thatsachen sich mit dieser Annahme in erfreulicher Weise decken, und haben somit die Berechtigung geschaffen, auf derselben weiter zu bauen, „wenn auch noch Niemand diese dipolaren Molekeln gesehen hat,“ so wenig wie die elektrischen Molekeln von Ampère im Magnet!

Es ist ferner unzweifelhaft und ebenfalls durch zahlreiche Thatsachen zu begründen, daß die kleinsten Theilchen gerade in den elektrischen Organen unter dem eigenthümlichen, mit der Entwicklung verbundenen Quellungsvorgang eine hochgradige Fähigkeit bekommen müssen, sich in besonderer Weise zu ordnen; denn selbst der gröbere, am entwickelten Organ kenntlich werdende Aufbau zeigt eine neue, der ursprünglichen (muskulären) fremde Ordnung der Elemente.

Wenn wir auch nicht hoffen dürfen, die morphologischen Charaktere der dipolaren Molekeln zu ergründen, so fehlt es

doch nicht an Beobachtungen histologischer Natur, welche auf eigenthümliche Gruppierungen kleinster Theilchen in den festweichen Substanzen der elektrischen Organe hinweisen.

Darin ist besonders die mikroskopische Untersuchung des mächtigen Organs vom amerikanischen Gymnotus lehrreich. Die quer zur Längsaxe des Körpers gestellten, bandförmigen Platten sind hier verhältnißmäßig dicklich, und so gelingt es an Durchschnitten gut conservirter Platten in dem der Nervenaustritt zugewendeten Theil äußerst zarte Anordnungen kleinster Körperchen in längs gestellten Reihen zu bemerken. Eine regelmäßig zu beobachtende Längsreihe von etwas größerem Ansehen zieht sich durch die Mitte hornartiger Verlängerungen der Platte, welche die zutretenden Nerven zu tragen haben.

Eine ganz ähnliche Körnchenschmür findet sich auch im Stiel der elektrischen Scheiben des Zitterwelses, wo sie bereits von Hrn. Babuchin gesehen wurde.

Wenn nun selbst bei dem lebendigen, contractionsfähigen Muskel die meisten neueren Autoren darüber einig sind, daß die contractile Substanz sich in einem so weichen, veränderlichen Aggregatzustand befindet, um im Moment sich vollziehende Umlagerungen der Substanzen desselben zu erlauben, wo liegt nun wohl die Schwierigkeit, die der Annahme entgegen stünde, daß die nachgewiesenen, elektrischen Ströme auf die kleinsten Theilchen solcher Organe eine richtende Wirkung ausüben? Der leitende Theil der lebenden Nervenfasern, ein zarter Strang im Innern derselben, Axencylinder genannt, ist jedenfalls auch von sehr weicher Beschaffenheit.

Hrn. du Bois-Reymond folgend, kommen wir durch diese Annahme zu der Vorstellung, daß der auf die verhältnißmäßig ungeheure Endausbreitung der Nerven im elektrischen

Organ übertragene Willensimpuls plötzlich die vorher sich gegenseitig im Gleichgewicht haltenden dipolaren Molekeln einseitig richtet und so durch sich summirende Wirkung der nach einerlei Seite gewendeten, gleichnamigen (positiven) Pole in gleicher Richtung einen nach Außen wirksamen Strom von entsprechender Stärke entstehen lasse.

Wie dem auch sei, jedenfalls ist die Thatsache, daß die besondere Entwicklung eines früher muskulösen Gewebes unter Verlust der Contractionsfähigkeit eine enorm gesteigerte elektrische Leistung aufzuweisen hat, von weittragender, allgemeiner Bedeutung. Wie der Nerv im Muskel Contraction hervorruft, so bewirkt er in der Drüse Secretion, gleichfalls unter elektromotorischen Erscheinungen; sind in der Drüse keine plattenförmigen, nervösen Endorgane vorhanden wie im Muskel, sondern ist eine einfachere Form der Endigung ausgebildet, so gilt das Gleiche auch von den elektrischen Elementen des Zitterwelses im Vergleich mit Gymnotus und Torpedo. Doch ist die feinkörnige, festweiche Substanz, welche der elektromotorischen Kraft die Ausbreitung in die Fläche verschafft, hier ebenfalls stark entwickelt. Es mag also beim Zitterwels der Nervenimpuls als elektrischer Schlag sich geltend machen, der sonst zur Schleimsecretion anregte, wenn er nicht umgewandelte Schleimzellen elektrisch reizte.

Die Richtigkeit der eben entwickelten Theorie vorausgesetzt, hätte somit das Studium der elektrischen Fische auch in der Frage nach der geheimnißvollen Wirkung des Nerven auf seine Endorgane uns überraschende Aufschlüsse verschafft. Wer möchte leugnen, daß noch zahlreiche dunkle Punkte aufzuhellen sind, ehe es gelingt, diese Theorie zur vollgültigen Thatsache zu erheben; aber es ist gewiß schon ein Gewinn, daß festgestellt wurde,

eine wie active Rolle die Electricität als solche im thierischen Organismus spielt, und daß die unzweifelhaft mit den Lebensvorgängen ablaufenden elektrischen Erscheinungen nicht nur eine untergeordnete Bedeutung als unvermeidliche Nebenwirkungen solcher Vorgänge zu beanspruchen haben. —

Unter den mancherlei ungelösten Problemen, welche sich dem Forscher bei dem Studium der elektrischen Fische aufdrängen, scheint eins von allgemeinerem Interesse, und hat bereits wiederholtlich Beachtung gefunden, ohne daß bisher eine befriedigende Antwort gegeben worden wäre. Wenn man sieht, wie die elektrischen Fische unter den verwandten Geschöpfen ihrer Umgebung Tod und Verderben verbreiten, so wird man unvermeidlich zu der Frage geführt: Wie kommt es denn, daß die wuchtigen Schläge machtlos an anderen elektrischen Fischen abgleiten, daß sie sich nicht selbst dadurch erschlagen, oder die Brut in ihrem Leibe, soweit die Arten lebendiggebärend sind?

Ist ihr Nervensystem von anderem Stoff gebaut? Sind Schutzrichtungen vorhanden, welche die zarten Gewebe den verderblichen Wirkungen starker elektrischer Schläge entziehen? Thatsächlich sehen wir in dem Bereich der gewaltigen Stromcurven eines gereizten elektrischen Fisches, welche andere Bewohner des Wassers sofort der Vernichtung weihen würden, Individuen gleicher Art mit stoischer Ruhe aussharren, der weibliche Zitterrochen bringt seine Jungen lebend zur Welt, obwohl die elektrischen Ströme, welche ihm seine Beute zuführen, nachweislich auch sein Körperinneres durchströmen; auch künstlich erzeugte Electricität von bedeutender Stärke gleitet spurlos an ihnen ab, mit einem Wort: Die elektrischen Fische erscheinen gefeit (immun) gegen die Einwirkung der Electricität überhaupt.

Diese überraschende Thatfache, welche man mit dem Namen der Immunitätslehre bezeichnet hat, harret noch immer ihrer richtigen Deutung; auch ich erkläre mich außer Stande, den Schleier zu lüften, welcher über diesem Geheimniß ruht. Indessen möchte ich doch meiner Ueberzeugung Ausdruck geben, die, soviel ich weiß, auch von anderen Forschern getheilt wird, daß in Wahrheit die elektrischen Fische keine völlige Immunität gegen Elektrizität besitzen, sondern nur eine sehr hochgradige Widerstandskraft gegen die Wirkung derselben. Es ist hinreichend festgestellt, daß diese Widerstandskraft bei den Thieren überhaupt außerordentlich verschieden ist, selbst bei Individuen derselben Art, wie wir ja auch am Menschen täglich zu beobachten Gelegenheit haben.

Nimmt man nun an, daß eine nicht elektrische Fischart in der oben näher erörterten Weise im Laufe der Jahrtausende allmählich zur Ausbildung eines elektrischen Organs gelangte, also allmählich schlagen lernte, so wird sich in gleichem Maße bei der Art eine mit der Kraft sich steigende Gewöhnung an die Wirkung des Schlages haben ausbilden müssen. Der darin erreichte Grad der Vollkommenheit übersteigt unser Vorstellungsvermögen, aber im Princip ist doch eine bestimmte Grenze für die möglicher Weise zu erreichende Gewöhnung nicht wohl festzusetzen, so lange nicht durch den elektrischen Strom eine so hochgradige Elektrolyse veranlaßt wird, daß die durchströmten Gewebe brandig werden. Auch die Unempfindlichkeit der zarten Brut im Mutterleibe würde unter denselben Gesichtspunkt fallen; denn wie die sich entwickelnden Jungen nach dem Gesetze der abgekürzten Vererbung die foetalen Muskelfasern nicht erst zu Muskeln und dann zu elektrischem Organ, sondern sogleich zu Organ ausbilden, bringen sie auch die übrigen Anlagen, wie sie

der nunmehr florirenden Art eigen sind, mitsammt der elektrischen Abhärtung als Ausstattung für's Leben mit.

Es kommt hinzu, daß gerade der Zitterrochen sich nicht besonders durch Kraft auszeichnet, und außerhalb des Wassers sind die für die hintere Hälfte des Körpers, also auch für die Baucheingeweide entfallenden Stromcurven so wenig dicht, daß man einen ganz ausgeruhten derartigen Fisch am Schwanz fassen und erheben kann, ohne eine Spur von elektrischer Wirkung zu spüren. Der Zitterrochen kennt diese seine Schwäche sehr wohl und bemüht sich sichtlich, frampfhaft gegen die haltende Hand aufgebäumt, mit der undulirenden Brustflosse dieselbe zu erreichen und so seinen Schlag anzubringen. Im gutleitenden Seewasser werden die Ströme auch nach rückwärts sowie quer durch den Körper sich leichter verbreiten; trotzdem erscheint mir der Versuch nicht aussichtslos, einen schädlichen Einfluß auf die Entwicklung der Brut bei trächtigen Torpedines durch starke Schläge künstlicher Electricität auszuüben. —

Doch ich fürchte die Geduld meiner verehrten Leser zu ermüden, indem ich allzuweit in dies unendliche Gebiet schweife, zumal dabei leider mehr Fragen zu stellen, als Antworten zu geben sind. Hoffentlich sind dabei aber doch die Elektriker von Natur aus den Tiefen des Meeres und der Flüsse in der Achtung der Leser einigermaßen gestiegen. Da wir selbstüchtigen Menschen es nun doch einmal nicht lassen können, im Makrokosmos der Naturreiche wie im kleinlichen, alltäglichen Getriebe des menschlichen Mikrokosmos nach dem Nutzen zu fragen, so bin ich auch hinsichtlich der in Rede stehenden Untersuchungen einer derartigen Frage wohl gewärtig.

Unter solcher Voraussetzung möchte ich darauf hinweisen, daß der arabische Fischer des Nildelta das elektrische Hautorgan

des Zitterwelses an der Sonne trocknet und mit Fett zu einer Art Salbe vermischt, welche als ein geschätztes Mittel zur Einreibung bei rheumatischen Krankheiten gilt. Freilich kann ich mir nicht verhehlen, daß die Anwendung dieses Specificum's kaum großes Vertrauen von Seiten des Lesers finden dürfte, und er also diesen Nutzen wohl in Frage stellen wird.

Vielleicht gelingt es aber die elektrischen Fische bei uns so weit zu acclimatistren, daß sie als lebendige Elektrifirmaschinen zum medicinischen Gebrauch benutzt werden können. — Nun, auch dieser Nutzen wird vor einer kritischen Beleuchtung mancherlei Bedenken erregen, obwohl solche Verwendung der elektrischen Fische thatsächlich stattgefunden hat und bis in frühe Perioden unserer Geschichte hinaufreicht.¹²⁾ Es galt migraineartigen Kopfschmerz durch Auflegen von ein oder mehreren lebenden Zitterrochen auf den leidenden Theil zu heilen, wie solches schon von griechischen und römischen Aerzten vorgeschlagen wurde:

Mit Recht spricht also der englische Forscher Wilson davon, daß die elektrischen Fische die am frühesten von der Menschheit verwendeten elektrischen Maschinen seien. Wenn heute die Elektrotherapie sich mit stolzen Erfolgen brüsten kann, so läßt sich doch nicht leugnen, daß ihre Entstehung von dem Zeitpunkt zu datiren ist, wo die lebendigen Elektrifirmaschinen in den Händen der alten Aerzte gegen Leiden in's Feld geschickt wurden, welche noch heut durch künstliche derartige Maschinen bekämpft werden.

Vielleicht hat der gelinde Schauder, welcher eine zart besaitete Dame bei der innigen Berührung mit dem durch Schönheit nicht gerade ausgezeichneten Zitterrochen ergreifen dürfte, sogar eine ganz besonders heilsame Wirkung und erscheint geeignet, selbst die hartnäckigsten Kopfschmerzen zu vertreiben, während

sie bei solchen Kranken bekanntlich häufig jeder anderen Behandlung spotten.

Doch — um ernst zu sprechen — was berechtigt uns von der Wissenschaft als der lichtgeborenen Himmelstochter niedrige Magdendienste zu beanspruchen? Hier, wie in allen ähnlichen Fällen, muß dem zudringlichen Verlangen die Ueberzeugung entgegen gestellt werden, daß die Wissenschaft noch nie ihre göttliche Abkunft verleugnet hat und diese allerdings gerade durch die bewunderungswürdige Gabe am herrlichsten bekundet, Segen zu spenden, wo sie um ihrer selbst willen umworben wird.

Kann der Arzt denn mehr sein als ein Stümper, so lange er an dem wundervollen Instrument, wie es der menschliche Organismus in Wahrheit darstellt, nicht die Gesetze kennt, nach welchen die einzelnen Saiten desselben zu inniger Harmonie zusammenklingen? Was ist denn die Elektrotherapie als Wissenschaft, wenn wir auch keine Ahnung davon haben, was die Elektrizität in unserem Körper selbstthätig für eine Rolle spielt? Wenn Worte wie Willensimpuls, Nervenleitung, Nerveneinfluß, Muskelcontraction, Secretion u. s. w. kaum mehr darstellen, als leere Worte, deren Bedeutung gerade im wichtigsten Punkt, der physikalischen Grundlage erst gefunden werden soll?

Jede Untersuchung, welche die menschliche Erkenntniß in diesen schwierigen Problemen auch nur um einen Schritt weiter bringt, bezeichnet einen Markstein am Wege zum fernen Ziel und ist eine segnenverheißende Bürgschaft künftiger, erspriesslicherer Pflege und Behandlung unseres Körpers in gesunden und kranken Tagen.

Das ist der Nutzen, den die Wissenschaft nicht als sofortige Bezahlung für geleistete Dienste, sondern als göttliche, freiwillige

Belohnung für treue, selbstlose Hingabe an das mühsame Werk der Forschung wenn auch in ferne, so doch sichere Aussicht stellt!

Möge dieselbe noch manchen Jünger begeistern, zum künftigen Nutzen für die Menschheit auch den wunderbaren Geheimnissen, welche die Natur in den elektrischen Fischen niedergelegt hat, mit Emsigkeit nachzuspüren!