Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Meteorologie

Trabert, Wilhelm

Berlin [u.a.], 1918

Die Strahlung von Sonne und Himmel

[urn:nbn:at:at-ubi:2-5058](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:at:at-ubi:2-5058)

rungen aufgezeichnet werden können. Die Ballon- und Drachenaufstiege haben, auch wenn sie täglich erfolgen, doch nur den Charakter von Einzelbeobachtungen, die uns für einen gegebenen Augenblick über den Zustand der Atmosphäre in verschiedenen Höhen orientieren.

Natürlich trachtet man danach, auch Drachen und Fesselballons womöglich täglich hochzulassen, so daß die Gründung eigener aerologischer Institute, wie z. B. jenes von Lindenbergl bei Berlin, sich als immer dringendere Ergänzung der meteorologischen Anstalten herausstellt.

Die Strahlung von Sonne und Himmel.

§ 7. Begriff der Strahlung.

Wo immer ein wärmerer und ein kälterer Körper einander gegenüberstehen, beobachten wir, daß von dem ersteren auf den letzteren Wärme übergeht. In betreff der Art, wie dieser Übergang erfolgt, müssen wir zwei Vorgänge unterscheiden. Wir beobachten einmal, beispielsweise bei einer in einem Gefäß auf eine heiße Herdplatte gestellten Flüssigkeit, daß die von dem heißen Herde zur kälteren Flüssigkeit übergehende Wärme zuerst die dazwischenliegende Gefäßwand erwärmen muß, derart, daß eine stetige Abnahme der Temperatur von der Platte bis zur Flüssigkeit eintritt und die Wärme allmählich von Schichte zu Schichte „geleitet“ wird.

Ein anderes Mal, wenn wir uns z. B. einem heißen Ofen nähern, beobachten wir einen Wärmeübergang auf unseren Körper, ohne daß deshalb die dazwischenliegende Luft eine besonders hohe Temperatur zu besitzen braucht; ja wir können sogar ein plattenförmig gestaltetes Stück Eis zwischen uns und den Ofen einschalten: die Wärme geht ungehindert

hindurch, obwohl die Temperatur des Eises 0° nicht übersteigt. Wir können dagegen dadurch, daß wir einen Metallschirm, der vielleicht viel wärmer ist als das Eisstück und etwa die Zimmertemperatur besitzt, dazwischen stellen, sofort den Übergang der Wärme abschneiden. Hier haben wir es offenbar mit einem von dem Wärmeübergang durch „Leitung“ verschiedenen Vorgang zu tun und sagen, die Wärme gehe durch „Strahlung“ von dem einen Körper zum anderen über.

Besonders deutlich beobachten wir den durch Strahlung erfolgenden Wärmeübergang, wenn wir uns einem glühenden Körper nähern. Wir machen hierbei die weitere wichtige Beobachtung, daß die durch Strahlung ausgesandte Wärme in enger Beziehung steht zu dem Lichte, welches der glühende Körper ausstrahlt; daß gleich diesem auch die ausgestrahlte Wärme sich geradlinig ausbreitet, und daß die Intensität der auf die Flächeneinheit entfallenden Strahlung so wie beim Licht $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{16}$... wird, wenn die Entfernung um das Zwei-, Drei-, Vierfache wächst.

Wie das Licht, läßt sich auch die Wärmestrahlung durch Metallspiegel zurückwerfen; wie dieses, wird sie von einem beruhten Körper vollständig aufgesogen, wie man sich ausdrückt, „absorbiert“. Kurz, sie ist vom Lichte nicht zu trennen und hat mit diesem alle Eigenschaften gemein. Nicht anders verhält es sich mit der von einem nur erhitzten, noch nicht glühenden Körper ausgestrahlten Wärme: alle Eigentümlichkeiten der Strahlen finden wir hier wieder, nur die Wirkung auf unser Auge, die Lichtwirkung, fehlt.

Die Beobachtung der Eigentümlichkeit der Lichtstrahlen, sich durch ein Glasprisma brechen und in ein farbiges, sogenanntes Spektrum verwandeln zu lassen, hat dahin geführt, unendlich viele Strahlenarten zu unterscheiden. Da nun nach den Lehren der Physik jeder Strahl in einer wellenförmigen Bewegung eines außerordentlich feinen, überall

verbreiteten mutmaßlichen Stoffes, des „Äthers“, besteht, so kann dieser Unterschied der Strahlen und ihrer Dualität nur durch die Länge der Wellen, welche den Strahl ausmachen, bedingt sein.

Wir haben es somit bei einem Strahle mit einer besonderen Art der Energie zu tun: mit Energie in schwingender Form. Die Menge von Energie, welche ein Strahl enthält, bestimmt seine Intensität, die Wellenlänge seine Dualität.

In ihrem Wesen sind alle Strahlen gleich, und es besteht zwischen Wärme-, Licht- und chemischen Strahlen kein wesentlicher Unterschied. Jeder Strahl wird von einem be-
 ruhten Körper, auf den er fällt, aufgesogen; seine Energie verwandelt sich in Wärme. Insofern sind alle Strahlen Wärmestrahlen. Jedoch sind nur gewisse Strahlen — jene, deren Wellenlängen zwischen 0,00036 mm (violett) und 0,00081 mm (rot) liegen — befähigt, die Netzhaut unseres Auges zu erregen, hier als Licht zu wirken und den Eindruck dieser oder jener Farbe hervorzurufen. Wiederum haben auch nur gewisse Strahlen die Eigenschaft, bei einer bestimmten Substanz chemische Veränderungen hervorzurufen.

Abgesehen von diesen durch die Wellenlänge bestimmten Unterschieden, verhalten sich alle Strahlen gleich. Hinsichtlich der Fortpflanzung, Reflexion, Brechung, Beugung, Interferenz der Strahlen usw. gelten dieselben Gesetze, welche bezüglich der Lichtstrahlen, die wir so leicht und bequem mit unserem Auge verfolgen, allgemein bekannt sind.

Auch den leeren Raum, insoweit wir einen solchen herstellen können und insoweit ein solcher im freien Weltraume vorhanden ist, vermag die Strahlung zu durchsetzen. Für den Energieaustausch zwischen Himmelskörpern ist diese Eigenschaft somit von höchster Bedeutung; ja es scheint, daß die Strahlung überhaupt der einzige Weg ist, auf welchem ein solcher Austausch tatsächlich vor sich geht.

§ 8. Problem der Sonnenstrahlung.

Es wurde schon hervorgehoben, daß die Strahlung der Sonne die letzte Ursache aller Veränderungen in der Atmosphäre sei. Es ist aber auch nicht mehr daran zu zweifeln, daß dieser Energieaustausch in einem bedeutenden Temperaturgegensatz zwischen Sonne und Erde seine Erklärung findet, daß mit anderen Worten die Sonne ein glühender Körper sei. Es läßt sich sogar mit einiger Sicherheit die Temperatur ihrer Oberfläche angeben, wofern es nur gelingt, die Wärme zu ermitteln, welche an der Grenze der Atmosphäre im Laufe einer Minute einem Quadratcentimeter zugeführt wird.

Die Bestimmung dieser letzteren Größe, der „Solarconstante“, ist nun aber durchaus keine leichte Aufgabe. Wir beobachten ja die uns von der Sonne zukommende Strahlung erst, nachdem dieselbe eine beträchtliche Strecke in der Atmosphäre zurückgelegt hat; daß sie auf diesem Weg nicht ungeändert bleibt, dafür liefern die Beobachtungen auf hohen Bergen den besten Beweis. Dort, wo die Sonnenstrahlen erst einen weit kürzeren Weg in der Atmosphäre zurückgelegt haben, ist die Intensität der Strahlung unvergleichlich größer; mitten in Eis und Schnee empfindet man den Sonnenschein als eine oft geradezu unangenehme Wärme. Sollte es nun nicht möglich sein, aus dieser mit der Höhe wachsenden Intensität der Strahlung auf die Intensität an der Grenze der Atmosphäre zu schließen?

Das Problem ist also das, den Energiestrom, welcher sich von der Sonne auf unsere Erde ergießt, seinen ganzen Weg entlang zu verfolgen. Was kommt an der Grenze der Atmosphäre an? was an der Erdoberfläche? Was wird aus der Differenz längs des Weges durch die Atmosphäre? Auf jede dieser Fragen werden wir eine Antwort geben müssen; sowohl in betreff der quantitativen Bestimmung der in dieser

Strahlung der Erde zugeführten Wärmemenge, als auch der Qualität der Strahlen. Sollten sich vielleicht an der Grenze der Atmosphäre andere Wellenlängen vorfinden als unten an der Erdoberfläche? All diese Fragen müssen wir beantworten, denn erst, wenn wir die Geschichte jedes einzelnen Sonnenstrahls auf seinem Durchgange durch die Atmosphäre kennen, ist auch die Wirkung bestimmt, die er längs seines Weges auszuüben vermag.

§ 9. Messung der Sonnenstrahlung.

Vor allem bedarf man zu diesem Zweck eines Instrumentes, mit Hilfe dessen wir die gesamte Sonnenstrahlung auffangen und messen können. Wir haben im Ruß einen Körper kennen gelernt, welcher alle Strahlen fast vollständig auffaßt. Wenn wir also ein Thermometer mit einer Ruß-

Fig. 2. Violles Aftinometer.

schichte überziehen, die Sonnenstrahlen darauffallen lassen, so wird, da sich die Energie der absorbierten Strahlen in Wärme verwandelt, eine Temperaturerhöhung eintreten, und wir werden aus der Temperatursteigerung auf die Wärme schließen können, die dem Thermometer zugeführt

wurde. Die Bestimmung der Strahlungsintensität würde in der That gar keine Schwierigkeiten bieten, wenn nicht das geschwärzte Thermometer, sobald seine Temperatur die der Umgebung übersteigt, durch Strahlung, Leitung usw. Wärme an die Umgebung verlieren würde.

Man hat diese Schwierigkeit beispielsweise bei Violles Aftinometer (Strahlenmesser) dadurch behoben, daß man die geschwärzte Kugel des Thermometers TT' (Fig. 2) im Mittelpunkt einer Hohlkugel anbrachte, die durch hindurchströ-

mendes Wasser w auf konstanter Temperatur erhalten wird. Der Sonnenstrahlung kann in einem gegebenen Momente der Zutritt durch eine Öffnung o gestattet werden, und man beobachtet nun die Erwärmung unter dem Einflusse erstlich der zugeführten Sonnenstrahlung und zweitens des Wärmeverlustes an die Umgebung von konstanter, aber bekannter Temperatur. Das Thermometer wird sich so lange erwärmen, bis sich die Zufuhr und der Verlust von Wärme das Gleichgewicht halten.

Es ist nun aber durchaus nicht schwer, durch eine zweite Beobachtung den Verlust an Wärme zu bestimmen. Wir brauchen nur den Zutritt der Sonnenstrahlung, wenn sich das Thermometer erwärmt hat, wieder abzusperren. Was werden wir dann beobachten? Die Temperatur des Thermometers wird langsam zu sinken beginnen, wir beobachten ja jetzt allein den Wärmeverlust an die kältere Umgebung. Kennen wir aber den letzteren, so können wir aus der Anfangsbeobachtung, bei welcher wir Einstrahlung und Verlust gemessen haben, den letzteren ausscheiden und finden so den Betrag der Strahlung auf eine bestimmte, durch den Durchmesser der Thermometerkugel gegebene Fläche.

In neuerer Zeit hat Augström eine wesentlich bessere Methode bei der Konstruktion seines Aktinometers angewandt. Der Hauptsache nach besteht dasselbe aus zwei, möglichst gleichen, einseitig geschwärzten, sehr dünnen Metallplättchen p p' , an deren Rückseite in der Mitte ein Thermoelement angebracht ist. In der Fig. 3 sieht man bloß den Verbindungsdraht d .

Es kann nun abwechselnd je ein Plättchen p von den Sonnenstrahlen getroffen werden, das andere, p' , wird durch einen vorgeetzten Schirm beschattet.

Fig. 3. Prinzip des Aktinometers von Augström.

Das besonnte erhält nun durch Strahlung Wärme zugeführt und seine Temperatur steigt. Durch das beschattete kann ein regulierbarer elektrischer Strom s geschickt werden, dessen Intensität i gemessen werden kann. Auch dieses erwärmt sich infolge des durchfließenden Stromes.

Man kann nun die Stromstärke so ändern, daß das letztere Plättchen durch den Heizstrom ebensoviele Wärme bekommt, als das andere Plättchen durch die Sonnenstrahlung.

Wenn dies der Fall ist, sind beide Plättchen gleichwarm, dann gibt das Thermoelement auf der Rückseite der Plättchen keinen Thermostrom, was man wieder an einem Galvanometer erkennen kann. Man ist so in der Lage, die Sonnenstrahlung, die gleich der Wärme des Heizstromes ist, durch die Intensität dieses Stromes zu messen.

Anderer z. T. nur für relative Messungen verwendbare Apparate sind in neuester Zeit von Michelson und Abbot konstruiert worden. Wir können hier nicht näher darauf eingehen.

Eine längere Beobachtungsreihe mit einem der älteren Apparate liegt von Montpellier vor. Dort hat man täglich, wofür es die Witterung gestattete, die Intensität der Sonnenstrahlung gemessen.

Wir haben aber schon gesehen, daß die Intensität der Strahlung wesentlich davon abhängt¹⁾, wie dick die Atmo-

Fig. 4.

sphärenschicht ist, welche die Strahlen zu durchsetzen haben. Es ist deshalb selbstverständlich, daß bei niedrigerem Sonnenstand, wenn der Strahlenweg $A'B$ (Fig. 4) größer

ist als AB bei hohem Sonnenstande, die Intensität in B , dem Beobachtungsort an der Erdoberfläche EE' , eine andere sein wird; will man daher vergleichbare Messungen erhalten, so sind dieselben alle auf dieselbe Sonnenhöhe zu beziehen.

¹⁾ Bouguer hat für diese Abhängigkeit sogar ein Gesetz gefunden.

Montpellier, geographische Breite 43° 36'.

Monat	Tageslänge Stunden	Sonnenschein ¹⁾ Prozente	Intensität d. St. ²⁾ Kalorien	Wärme pro Tag Kalorien	Durch- lässigkeit ³⁾ Prozente
Jan.	9,5	41	1,05	82	70
Febr.	10,5	47	1,09	127	64
März	12,0	48	1,12	184	57
April	13,2	46	1,16	229	57
Mai	14,7	53	1,14	296	51
Juni	15,4	56	1,14	311	48
Juli	15,0	62	1,13	325	47
Aug.	14,0	67	1,12	295	48
Sept.	12,6	54	1,12	225	56
Okt.	11,0	48	1,08	135	59
Nov.	9,8	38	1,05	90	67
Dez.	9,0	36	1,01*	61	71

Die in vorstehender Tabelle (Kol. 3) angegebenen Intensitäten der Sonnenstrahlung sind in Montpellier stets gegen Mittag beobachtet worden. Diese Zahlen geben an, wieviel Wärme einem Quadratcentimeter bei senkrechtem Einfallen der Strahlen in der Minute zugeführt wird. Diese Wärmemenge beträgt etwa 1 Kalorie, d. h. sie ist so groß, daß sie 1 g Wasser von 0° auf 1° C zu erwärmen vermag. Sie ist im Winter kleiner, im Sommer größer.

Da man nun aber die Tageslänge in Stunden kennt, da man auch weiß, wie lange im Durchschnitt die Sonne während des Tages wirklich scheint und nicht durch Wolken abgehalten wird, so kann man leicht ermitteln, wieviel Wärme im Lauf eines Tages auf 1 qcm des Erdbodens fällt. Diese Daten enthält die vierte Kolonne; dabei fällt uns sofort der große Gegensatz zwischen Sommer und Winter auf. Während des ganzen Sommers werden 1 qcm der Erdoberfläche in

¹⁾ Verhältnis der wirklichen Sonnenscheindauer zur möglichen: d. h. von je 100 Minuten, während welcher die Sonne tatsächlich am Himmel steht, scheint sie 41, 47... Minuten.

²⁾ Mittel der Jahre 1883—1900.

³⁾ Wenn die Sonne tatsächlich im Zenit stünde.

Montpellier fast 29 000, im Winter nur wenig über 8000, im Frühjahr etwa 22 000, im Herbst fast 14 000 Kalorien zugeführt; man kann somit die gesamte gegen 1 qcm gesandte Sonnenstrahlung auf rund 72 000 Kalorien schätzen, d. h. sie wäre imstande, eine Eisschicht von etwa 10 m Dicke zu schmelzen.

Wir stellen hier der Jahressumme von Montpellier jene einiger anderer Orte in Tausenden Kalorien gegenüber:

Wien	Davos	Kiew	Warschau	Potsdam	Stockholm	Teurenberg (Spitzbergen)
52	78	61	47	54	55	17

Wie die letztere Spalte der Tabelle für Montpellier zeigt, ist auch die Durchlässigkeit der Atmosphäre, welche man durch Beobachtung der Strahlung bei niedrigem und hohem Sonnenstand leicht ermitteln kann, im Lauf des Jahres verschieden; im Sommer ist sie gering, im Winter größer, und im Mittel würden bei Zenitstellung der Sonne nur etwa 58% der Sonnenstrahlen an der Erdoberfläche anlangen.

Deutlich geht dieser Einfluß der Atmosphäre aus nachstehender Übersicht hervor, welche Biolle berechnet hat. Es gelangen nämlich, und zwar wieder, wenn die Sonne im Zenit stünde, von 100% an der Grenze auffallenden Strahlen bis

Montblanc (4810 m)	Grands Mulets (3040 m)	Bossongletscher (220 m)	Grenoble (215 m)	Paris (60 m)
94%	89%	79%	71%	68%

§ 10. Verteilung der Intensität auf die einzelnen Wellenlängen.

Weit schwieriger, als die Bestimmung der Gesamtintensität der Sonnenstrahlung, ist die Ermittlung ihrer Qualität. Zu diesem Behuf ist festzustellen, wie sich die Intensität auf die einzelnen Strahlenarten, welche uns die Sonne zu-

sendet, verteilt. Durch langjährige Messungen mit einem äußerst feinen und empfindlichen Instrument, dem „Bolometer“, ist es dem Amerikaner Langley gelungen, in diese Frage Klarheit zu bringen. Man kann nämlich die Sonnenstrahlung nicht bloß durch ein Prisma, sondern auch durch ein auf einem Spiegel eingeregtes, äußerst feines Gitter in ein Spektrum ausziehen. Langley verwendete dazu ein Gitter, das 68 000 Linien längs eines Zentimeters enthielt. Das Bolometer besteht nun im wesentlichen aus einem sehr dünnen, geschwärzten Platindraht, der durch dieses Spektrum hindurchbewegt wird und dabei die Wellenlängen absorbiert, welche auf dem $\frac{1}{2}$ mm breiten, vom Draht ausgefüllten Raum sich befinden. Durch die größere oder geringere Erwärmung des Drahtes wird nun seine Leitungsfähigkeit verändert, und da den Draht der Strom eines konstanten galvanischen Elementes durchfließt, so wird man aus der Änderung der Stromstärke auf die Energie der betreffenden Strahlenarten schließen können.

Schon bei seinen ersten Messungen konnte Langley nachweisen, daß sich in den Sonnenstrahlen Wellenlängen von etwa 0,30 bis 3 Mikron (1 Mikron = 1 Tausendstel Millimeter) vorfinden. Später gelang es ihm, Wellen bis zu 18 Mikron nachzuweisen; wahrscheinlich enthält aber das Sonnenspektrum Wellenlängen bis zu 30 Mikron. Die leuchtenden Strahlen machen somit nur etwa $\frac{1}{60}$ der ganzen Ausdehnung des Spektrums aus; da aber nach Fig. 5, welche die Energieverteilung im Sonnenspektrum nach den Messungen Langleys darstellt, gerade die Intensität der leuchtenden Strahlen sehr groß ist, so macht die Energie derselben etwa ein Drittel der Gesamtstrahlung aus.

Wie aber im leuchtenden Teile an manchen Stellen dunkle Linien (die bekannten Fraunhoferschen Linien) auftreten, so zeigt uns die Figur auch im dunklen Teile an manchen

Stellen Unterbrechungen, d. h. Wellenlängen, die, wenigstens an der Erdoberfläche, im Sonnenspektrum fehlen. Sollten dieselben etwa von der Erdatmosphäre absorbiert worden sein? Langley hat die auffallendsten dieser „kalten Bänder“ mit den griechischen Buchstaben Φ , Ψ , Ω bezeichnet, ja später noch ein Band X bei 2,64, ein Band Y bei 4,25 und endlich ein breites Band zwischen 5 und 11 Mikron nachgewiesen.

Auch die Entscheidung der Frage, ob diese Energieverteilung an der Grenze der Atmosphäre dieselbe sei, hat Lang-

Fig. 5. Energieverteilung im Sonnenspektrum. — Beobachtete Intensität
.... Ideale Verteilung.

ley durch Bolometermessungen angebahnt und sein Nachfolger Abbot erfolgreich fortgesetzt. Man ist dabei zu dem überraschenden Ergebnisse gelangt, daß die verschiedenen Wellenlängen in ganz verschiedenem Maße von der Atmosphäre durchgelassen werden: im allgemeinen die längeren Wellenlängen viel leichter, die kürzeren weniger leicht. So würden, wenn die Sonne im Zenit stünde, z. B. von der Wellenlänge 0,39 Mikron 45%, von 0,50 Mikron 71%, von 0,80 Mikron 86% und endlich von 1 Mikron sogar 90% von der Atmosphäre durchgelassen. Neben dieser, alle Wellenlängen umfassenden regelmäßigen Abschwächung finden wir an manchen Stellen (das sind eben die kalten Bänder) eine

unregelmäßige Abschwächung, ja volle Auslöschung gewisser Wellenlängen. Von dieser hochbedeutenden Erscheinung werden wir später noch zu sprechen haben.

1. Energieverteilung an der Grenze der Atmosphäre

2. E. verteilung an d. Erdoberfläche bei Zenitstand der Sonne

3. 4. 5. 6. " " " " " " " bei Sonnenhöhe von 30° , 20° , 15° u. 10°

Fig. 6. Energieverteilung bei verschiedenem Sonnenstand.

Was ist aber die Folge der regelmäßig mit der Verkürzung der Wellenlängen zunehmenden Schwächung der Strahlen? Offenbar die, daß, je länger der Weg ist, den die Strahlen in der Atmosphäre zurücklegen, um so mehr die kürzeren Wellenlängen geschwächt werden, also das In-

tenzitätsmaximum, wie es Fig. 6 zeigt, immer weiter gegen das rote Ende gerückt wird. Bei einer Sonnenhöhe von bloß 10° liegt das Maximum bei 0,72 Mikron im Rot. Da die Strahlen kürzerer Wellenlänge rasch an Intensität abnehmen, erscheint uns, wenn die Sonne nahe dem Horizont steht, ihr Licht fast rot. Mit zunehmender Höhe rückt das Maximum rasch vor; so finden wir es z. B. bei 30° Sonnenhöhe schon bei 0,56 Mikron im Gelb. An der Grenze der Atmosphäre liegt das Maximum nach Abbots neueren Bestimmungen bei 0,46 Mikron im Blau. Darauf bezieht sich auch Langleys Ausspruch, an der Grenze der Atmosphäre würde die Sonne uns blau erscheinen, weil eben die blauen und grünen Strahlen dort unverhältnismäßig stärker vertreten sind als an der Erdoberfläche.

§ 11. Die Solarkonstante.

Durch Langleys schöne Arbeiten, die in den Untersuchungen seines Nachfolgers Abbot eine erfolgreiche Fortsetzung fanden, sind jene Fragen, die das Problem der Sonnenstrahlung enthielt, teilweise bereits beantwortet. Wir kennen die Gesamtenergie der Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche wie ihre Verteilung auf die einzelnen Strahlenarten; da wir aber gesehen haben, wie jede einzelne Wellenlänge beim Durchgang durch die Atmosphäre geschwächt wird, so haben wir auch auf die Energieverteilung an der Grenze der Atmosphäre schließen können. Damit ist aber, und zwar durch Summation der Energien der einzelnen Strahlenarten, die Gesamtstrahlung, welche an der Grenze der Atmosphäre bei senkrechtem Auffallen der Strahlen auf 1 qcm in der Minute entfällt, also die „Solarkonstante“, gegeben. Nach Abbots zahlreichen Messungen in verschiedenen Höhen der Atmosphäre wurde ihr mittlerer Wert zu 1,93 Kalorien gefunden. Wir wollen sie zu rund 2 Kalorien annehmen.

Diese Größe wird je nach der Entfernung der Erde von der Sonne größer oder kleiner sein; erst in der neuesten Zeit sind die Messungen genau genug geworden, um so geringe Unterschiede feststellen zu können. Durch die eingehenden Untersuchungen Abbots ist es nun auch gelungen, einen Unterschied in der Strahlung je nach dem Stande der Sonnenflecken nachzuweisen. Einer Zunahme der Sonnenfleckenrelativzahl um 100 entspricht nach Abbots Ergebnissen eine Zunahme der Intensität der Strahlung um 0,07 Kalorien. Es konnte auch unzweideutig festgestellt werden, daß die „Solarkonstante“ keine konstante Größe ist, sondern kleinen, unregelmäßigen Schwankungen unterliegt, die ungefähr eine Periode von 10 Tagen besitzen.

Es bereitet nunmehr keine Schwierigkeiten anzugeben, wieviel Energie 1 qcm der Sonnenoberfläche pro Minute aussendet. Man kann dieselbe auf etwa 150000 Kalorien schätzen, d. h. sie ist so groß wie die Strahlung eines glühenden Kohlenkörpers von etwa 6000°C . Da das Emissionsvermögen der Sonne kaum viel geringer sein dürfte als dasjenige des Rußes oder der Kohle, so wird man etwa 6000°C als Temperatur der Sonnenoberfläche annehmen dürfen.

§ 12. Der Energieverlust in der Atmosphäre.

Wir stehen nun vor der Frage, was denn aus der Energie der Strahlen wird, welche bei deren Durchgang durch die Atmosphäre scheinbar verloren geht. Die nächstliegende Annahme wäre wohl die, daß dieselben von der Luft absorbiert und zur Erwärmung der letzteren verwendet werden. Wenn wir aber an die Erscheinung denken, daß ein in ein dunkles Zimmer fallender Lichtstrahl uns an den Staubteilchen der Luft dadurch sichtbar wird, daß an jedem einzelnen dieser Teilchen das Licht nach allen Seiten hin „diffus“ reflektiert wird, so muß man auch die Möglichkeit zugeben, daß die

Schwächung der Strahlen in der „diffusen Reflexion“ an den Luft- oder den Staubteilchen der Atmosphäre ihren Grund haben könnte.

In der Tat haben Theorie und Versuch gelehrt, daß die eine Art, die regelmäßig mit abnehmender Wellenlänge wachsende Schwächung, allein auf Rechnung der diffusen Reflexion der Strahlen zu setzen ist, und daß hierin die Ursache liegt, warum, wenn die Sonne über dem Horizont steht, auch der Himmel uns hell erscheint und uns einen beträchtlichen Anteil an Licht und Wärme zusendet. Es steht heute fest, daß es die Luftmoleküle sind, welche die zurückbehaltene Strahlung nach allen Seiten zerstreuen.

Wie aber steht es mit der ganz unregelmäßig gerade an bestimmten Stellen des Spektrums auftretenden Auslöschung der Strahlen, die wir als die „kalten Bänder“ Langley's kennengelernt haben? Sollte dieser Erscheinung nicht eine andere Ursache, etwa wirkliche Absorption, zugrunde liegen? Die Untersuchungen Angströms, Paschens und in neuerer Zeit Fowles, haben auch diese Frage bejaht; ja es gelang, im Wasserdampf und in der Kohlensäure direkt die Bestandteile der Atmosphäre festzustellen, welche diese Strahlenarten auffaugen und so zur Entstehung der einzelnen Bänder Veranlassung geben. Es zeigt nämlich der Wasserdampf bei jenen Strahlenarten Absorptionsmaxima, wo Langley die Bänder Ψ , Ω , X und das Band zwischen 5 und 11 Mikron nachwies. Das Band X kommt übrigens zum Teil auch auf Rechnung der Kohlensäure, welche gleichfalls hier und bei Band Y ein Absorptionsmaximum aufweist. Damit ist die hohe Wichtigkeit dieser beiden Gase für die Atmosphäre klargelegt, und wir verstehen jetzt auch, warum im Winter bei trockener Luft die Durchlässigkeit der Atmosphäre eine viel größere ist als im Sommer.

§ 13. Strahlung des Himmels und der Atmosphäre.

Außer der eben besprochenen diffusen Strahlung des Himmels, die ja im Grunde nur eine nach allen Seiten zerstreute Sonnenstrahlung ist, hat man früher auch an eine wirkliche Strahlung des Himmels gedacht, da man vielfach dem Weltraum eine bestimmte Temperatur, gewöhnlich etwa -150°C , zuschrieb. Heute wissen wir, daß wir dem Weltraum, wenn wir überhaupt von einer „Temperatur“ desselben sprechen wollen, nur die des absoluten Nullpunktes zuschreiben können; als diese pflegen wir -273°C anzunehmen. Es kann also nicht von einer Strahlung des Weltraumes, sondern nur von einer Ausstrahlung der Erde in den Weltraum die Rede sein. Die Sterne kommen als Wärmespender für die Erde nicht in Betracht; nur an der beleuchteten Mondoberfläche hat man das Vorhandensein einer allerdings minimalen und praktisch nicht in Betracht kommenden Strahlung nachzuweisen vermocht.

Wenn trotzdem auch in den Nachtstunden, in denen bloß die Ausstrahlung in den kalten Weltraum erfolgt, die Temperatur an der Erdoberfläche nur sehr langsam sinkt, so hat dies seinen Grund darin, daß die Atmosphäre selbst eine bedeutende Strahlung gegen jeden Punkt der Erdoberfläche aussendet. Maurer und andere haben direkte Messungen dieser Strahlung der Atmosphäre vorgenommen und gefunden, daß dieselbe im Durchschnitte 0,38 Kalorien pro Minute und qcm beträgt. Die Wärmemenge, die 1 qcm des Erdbodens von der Atmosphäre im Lauf eines Tages zugeht, kann also zu rund 550 Kalorien veranschlagt werden. Eine Untersuchung der in dieser Strahlung vorkommenden Wellenlängen wurde bisher noch nicht ausgeführt. Doch ist wohl nicht daran zu zweifeln, daß diese Strahlung von dem Wasserdampf und der Kohlensäure in der Atmosphäre herrührt, und daß darin gerade jene Strahlenarten vorkommen,

die uns in der Sonnenstrahlung (in den kalten Bändern) fehlen. Es ist ja ein physikalisches Gesetz, daß ein Körper, wenn er selbst strahlt, gerade jene Wellenlängen aussendet, die er sonst absorbiert.

Die Temperatur.

§ 14. Die Temperatur und ihre Messung.

Unter allen Veränderungen in der Atmosphäre machen sich die der Temperatur, d. h. des Zustandes, der sich für uns in der Empfindung von Wärme und Kälte äußert, am allermeisten fühlbar. Wir bedienen uns zu ihrer Messung des Thermometers, dessen Wesen auf der Eigenschaft der Flüssigkeiten und anderer Körper beruht, sich bei steigender Temperatur auszudehnen und umgekehrt sich zusammenzuziehen, wenn die Temperatur fällt.

Es ist an sich gleichgültig, welche Flüssigkeit dabei als thermometrische Substanz zur Verwendung kommt; doch besitzt Quecksilber wegen seiner regelmäßigen Ausdehnung und als guter Wärmeleiter mannigfache Vorzüge. Da es aber bei $-38,5^{\circ}\text{C}$ fest wird, so wendet man zur Messung tieferer Temperaturen vielfach das Alkoholthermometer an, das freilich die große Schattenseite hat, daß der Alkohol bei hoher Temperatur verdunstet und sich bei folgender Abkühlung an dem oberen Ende des Thermometerrohres wieder kondensiert.

Zur Bestimmung eines Ausgangspunktes und zur Wahl einer Einheit hat man sich für zwei Fixpunkte entschieden: die Temperatur des schmelzenden Eises und die des siedenden Wassers. Man hat sich geeinigt, bei den zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Thermometern diesen Abstand,