

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Europäische Höhlenfauna

Hamann, Otto

Jena, 1896

Nachtrag zu dem Verzeichnis der Höhlenkäfer von Dr. Herm. Krauss

Nachtrag

zu dem Verzeichnis der Höhlenkäfer von **Dr. Herm. Krauss***)
S. 257.

Konjsca jama bei Gross-Laschitz, vergl. S. 257.

Quedius mesomelinus Marsh, im hinteren Teil der Höhle.
Kommt auch sonst an dunklen Orten vor.

Dreibröderhöhle bei Gottschee.

Aphaobius Milleri an feuchten übersinterten Wänden, 7 Stück.

Jagdloch bei Oberskril, vergl. S. 258.

Anophthalmus Bilimeki nicht selten.

Bathyscia acuminata aus Moosköder gesiebt.

Scednenea nad Rajturnam bei Rašiza.

Bathyscia acuminata aus Laub in der Eingangshalle gesiebt.

Voleja jama, vergl. S. 259.

*Oryotus Schmidt*i zahlreich bei in der Höhle vorgefundenen
verschimmelten Rinderklauen.

Dolga und Podresca jama, vergl. S. 260.

Bathyscia Khevenhülleri mit *B. Freyeri* zusammen, aber weniger
häufig unter Steinen und an Fichtenzweigen.

Zu S. 143, Phryganeidae: *Micropterna testacea* Pict. erwähnt Rostock,
Neuroptera germanica, Zwickau 1888, S. 43, aus der Bielshöhle im Harz.

*) Adresse vom 15. Oktober an: Dr. H. Krauss, k. k. Salinenarzt in
Aussee, Steiermark.
