

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Ampelographisches Wörterbuch

Goethe, Hermann

Wien, 1876

Anhang. Alphabetisches Verzeichniss der in Amerika heimischen und bis jetzt beschriebenen 75 Varietäten von *Vitis cordifolia*, *labrusca*, *aestivalis* und *rotundifolia*, nebst ihren Hybriden, mit ...

Anhang.

Alphabetisches Verzeichniss

der

in Amerika heimischen

und bis jetzt beschriebenen 75 Varietäten

von

Vitis cordifolia, *labrusca*, *aestivalis* und *rotundifolia*, nebst ihren Hybriden,

mit besonderer Berücksichtigung

ihrer Widerstandsfähigkeit gegen *Phylloxera vastatrix*.

A.

Adirondac, blau, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Port Henry, Grafschaft Essex). Planchon, pag. 146, „Weinlaube“ 1870, pag. 83, und Grape Cultur I, pag. 325. Sämling von Isabella vom Jahre 1852, zu *Vitis labrusca* gehörig und frühreifend. Abgebildet bei Downing, pag. 529. Beschreibung nach R. Goethe. Blatt mittelgross, dunkelgrün, auffallend glänzend, dick. Beere sehr gross, rund, dunkelblau, frühreifend, wohlschmeckend.

Agawam, roth, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 163. (Rogers' Hybrid Nr. 15). Rebstock sehr starkwüchsig und fruchtbar. Traube gross, dichtbeerig, oft ästig. Beere sehr gross, dickhäutig, dunkelbraunroth, mit stark hervortretendem Beigeschmack.

Alexander, blau, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Florida). Nach v. Babo, pag. 678, und Planchon, pag. 146. Zu *Vitis labrusca* gehörig, mit den Syn. Captraube, Black Cape, Cape Grape. Rebstock sehr starkwüchsig, mit braunem, dunkel geflecktem und gestreiftem, weitknotigem Holz. Blatt sehr gross, dick, lederartig, wenig eingeschnitten, oben glatt, dunkelgrün, glänzend, unten weissfilzig, breit und kurz gezähnt; Blattstiel so lang als das Blatt, dick, röthlich; Triebspitzen weisswollig, im Frühjahre schön.

roth gefärbt. Traube mittelgross, locker, cylindrisch, gleichbeerig, sehr langstielig. Beere ziemlich gross, etwas länglich, blauroth, weissgrau beduftet, grossnarbig, dickhäutig, fleischig, mit erdbeerartigem Geschmack, frühreifend. Hiervon soll es noch eine weisse Spielart unter dem Namen „White Cape“ geben.

Allen's Hybrid, weiss, Kelter- und Tafeltraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 162, und Pulliat vignoble, pag. 99, mit Abbildung Nr. 50, als Hybride d'Allen. Soll durch Befruchtung von Isabella-Sämlingen mit weissem Gutedel entstanden sein. Holz stark, ein wenig weitknotig. Blatt gross, rund, oben und unten glatt, ziemlich eingeschnitten, breit gezähnt; Stielbucht geschlossen; Blattstiel sehr lang, stark, etwas wollig und roth. Traube mittelgross, sehr langstielig, mit fruchtbaren Knoten, an welchen gewöhnlich noch eine kleine Traube sitzt. Beere mittelgross, rund, grossnarbig, hellgrün bis gelb, etwas frühreifend und von angenehmem Geschmack.

Alvey, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 168, Grape Cultur I, pag. 16, und Pulliat. Zu *Vitis aestivalis* gehörig und gegen *Phylloxera* widerstandsfähig. Rebstock von mässigem Wachsthum und nicht sehr fruchtbar, mit dickem, engknotigen Holz, gegen zu grosse Sonnenwärme empfindlich. Blatt gross, wollig, nicht eingeschnitten. Traube locker, klein, ästig. Beere klein, rund, dünnhäutig, sehr saftig und von angenehmem Geschmack, frühreifend. Liefert guten Rothwein.

Amanda, hellroth, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 146. Traube mittelgross, dichtbeerig. Beere mittelgross, rund, etwas frühreifend, von gutem Geschmack. Gehört zu *Vitis labrusca*.

Anna, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Pulliat. Rebstock schwachwüchsig. Blatt klein, wollig, wenig eingeschnitten. Traube klein, kurz, cylindrisch. Beere mittelgross, länglichrund, blau, beduftet. Nach Planchon, pag. 146, gibt es auch eine weisse Traubensorte dieses Namens. Gehört zu *Vitis labrusca*.

Augwick, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 192. Eine zu *Vitis cordifolia* gehörige starkwüchsige Traubensorte. Traube ästig. Beere sehr gross, dunkelblau, liefert einen dunklen, guten Rothwein.

Autuchon, grün, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 198, ein Sämling von Clinton, welcher mit dem weissen Gutedel befruchtet wurde. Blatt dunkelgrün, sehr tief eingeschnitten. Traube sehr lang, ziemlich locker. Beere mittelgross, rund, grünlichweiss, dünnhäutig, von angenehmem Geschmack.

B.

Baldwin le noir, dunkelblau. Keltertraube. Amerika (Pennsylvanien). Nach Planchon, pag. 169, zu *Vitis aestivalis* gehörig. Rebstock starkwüchsig und fruchtbar. Traube klein, ziemlich locker. Beere klein, dunkelblau, von etwas herbem Geschmack.

- Barry**, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 163 (Rogers Nr. 43). Traube gross, etwas breit und dichtbeerig. Beere mittelgross, rund, dunkelblau, dünnschalig, frühreifend, ziemlich angenehm im Geschmack.
- Baxter**, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Pulliat und Planchon, pag. 169. Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Holz ziemlich stark, langgestreckt. Blatt ziemlich gross, oben glatt, unten blaugrün und etwas wollig, ziemlich eingeschnitten; Stielbucht offen; Blattstiel sehr lang und stark. Traube klein, pyramidal, etwas locker. Beere klein, blau, beduftet, spätreifend.
- Black Hawk**, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 148, und Pulliat. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Blatt mittelgross, wollig. Traube sehr gross, etwas locker, pyramidal. Beere ziemlich gross, rund, blau.
- Black July**, blau, Keltertraube. Amerika. Syn. Devereux, Sumpter, Lincoln, Maclean, Husson. Zu *Vitis aestivalis* gehörig. Nach Planchon, pag. 170, und Pulliat. Blatt ziemlich gross, wenig wollig und eingeschnitten, verbogen. Traube klein, dichtbeerig, cylindrisch. Beere klein, rund, blau, spätreifend.
- Bland**, roth, Keltertraube. Amerika (Virginien). Nach Trummer, Nachtrag, pag. 34, und Planchon, pag. 148. Syn. Blands Virginia, Red fox. Zu *Vitis labrusca* gehörig. Rebstock sehr stark und dauerhaft, mit langgestrecktem, kastanienbraunem, dünnem, schwarz punktirtem, weitknotigem Holz. Blatt sehr gross, eben, rund, dreispitzig, Lappen am Rande zurückgerollt, klein und kurz gezähnt, oben dunkelgrün, unten weissgrün, feinwollig. Traube locker, einfach, langstielig, gross. Beere dick, rund, dunkelroth, blaudeauftig, saftig und von gutem Geschmack, spätreifend.
- Brant**, blau, Keltertraube. Amerika (Washington). Nach Planchon, pag. 199 (Arnold's Hybrid Nr. 8). Rebstock starkwüchsig. Blatt dunkelgrün, mit rother Verfärbung, tief eingeschnitten, auf beiden Seiten glatt. Traube mittelgross. Beere blau, sehr saftig und angenehm, bei voller Reife aromatisch.
- Bullet** oder **Bullit**, siehe Taylor.

C.

- Canada**, blau, Keltertraube. Amerika. (Arnold's Hybrid Nr. 16). Nach Planchon, pag. 200, und Grape Cultur I, pag. 354. Rebstock kräftig, mit starker Belaubung und gut ausreifendem Holz. Traube ästig. Beere mittelgross, dünnschalig, blau.
- Captraube**, siehe Isabella und Alexander.
- Cassady**, grün, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 149, und Grape Cultur I, pag. 66. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Rebstock starkwüchsig und fruchtbar. Beere grünlichgelb, beduftet und einen vorzüglichen Wein liefernd.
- Catawba**, roth, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Carolina, Arkansas, Maryland, Pennsylvanien). Nach Planchon, pag. 143, Trummer,

Nachtrag, pag. 54, „Weinlaube“ 1870, pag. 83, Pulliat und Grape Cultur I, pag. 16. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Rebstock starkwüchsig und dauerhaft gegen Kälte, mit langgestrecktem, dünnem, dunkelbraunem, weitknotigem Holz. Blatt ziemlich gross, oben dunkelgrün, unten sehr wollig, wenig eingeschnitten; Triebspitzen beim Entfalten hellroth gerändert und wollig. Traube klein, cylindrisch, kurz. Beere rund, hellroth, beduftet, ziemlich dickhäutig, mit Himbeergeschmack, etwas spätreifend.

Challenge, roth, Kelter- und Tafeltraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 164. Rebstock starkwüchsig und fruchtbar. Traube kurz, dichtbeerig, geflügelt. Beere gross, ründ, hellroth, süss und saftig, frühreifend.

Christine, blau, Keltertraube. Amerika (Pennsylvanien). Nach Planchon, pag. 149. Zu *Vitis labrusca* gehörig. Rebstock sehr kräftig. Traube ziemlich gross, dichtbeerig. Beere gross, rund, blau, saftig.

Clinton, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 193, Grape Cultur. I, pag. 16, und Pulliat. Syn. Worthington. Gehört zu *Vitis cordifolia*. Rebstock starkwüchsig, dauerhaft, sehr tragbar und frühblühend. Blatt klein, herzförmig, oben glatt; glänzend, unten feinwollig; Stielbucht offen; Bezaehlung breit und kurz; Triebspitzen rothgrau, etwas wollig. Traube klein, cylindrisch, etwas locker. Beere klein, rund, fleischig, dunkelblau, beduftet, spätreifend. Eine weisse Spielart hiervon ist **Golden Clinton** mit Syn. King, nach Planchon, pag. 196, welche sich nur durch die weissgrünen Beeren von ihr unterscheidet. Beide sollen, wie die meisten Varietäten von *Vitis cordifolia*, gegen *Phylloxera* sehr widerstandsfähig sein.

Columbia, siehe Creveling.

Concord, blau, Keltertraube. Amerika (Massachusetts). Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 130, Grape Cultur. I, pag. 16, „Weinlaube“ 1870, pag. 83, und Pulliat. Rebstock ausserordentlich starkwüchsig und fruchtbar. Blatt sehr gross, glatt, sehr wollig, wenig eingeschnitten. Traube mittelgross, pyramidal, langstielig, etwas dichtbeerig. Beere gross, dickschalig, rund, dunkelviolett, beduftet, mit starkem Beigeschmack. Soll sich gegen *Phylloxera* ziemlich widerstandsfähig erweisen.

Cornucopia, blau, Keltertraube. Amerika. (Arnold's Hybrid Nr. 2). Nach Planchon, pag. 200, und Grape Cultur. I, pag. 90. Rebstock sehr dauerhaft und starkwüchsig, mit kurzknötigem Holz. Blatt gross, dunkelgrün, auf beiden Seiten glatt. Traube gross, dichtbeerig, ästig. Beere ziemlich gross, dunkelblau, beduftet, saftig, etwas frühreifend.

Creveling, blau, Keltertraube. Amerika (Pennsylvanien). Nach Planchon, pag. 151, Grape Cultur. I, pag. 16, und Pulliat. Zu *Vitis labrusca* gehörig. Syn. Columbia County. Blatt mittelgross, glatt, wenig wollig und eingeschnitten. Traube lang und locker, pyramidal.

Beere ziemlich gross, etwas länglich, blau, beduftet, dünnschalig, ziemlich frühreifend.

Cunningham, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 170, und Pulliat. Syn. Long. Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Blatt ziemlich gross, wollig, wenig eingeschnitten. Traube mittelgross, sehr dichtbeerig, pyramidal. Beere klein, dunkelblau, rund, beduftet, spätreifend. Soll gegen *Phylloxera* widerstandsfähig sein.

Cuyahoga, grün, Keltertraube. Amerika (Ohio). Nach Planchon, pag. 152. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Rebstock kräftig. Blatt mittelgross, wenig eingeschnitten, sehr wollig. Traube mittelgross, dichtbeerig. Beere mittelgross, hellgrün, bei voller Reife braun gefleckt, dünnschalig, saftig, süss.

Cynthiana, blau, Keltertraube. Amerika (Arkansas). Nach Planchon, pag. 172, Grape Cultur. I, pag. 20, und Pulliat. Syn. Red River. Zu *Vitis aestivalis* gehörend und gegen *Phylloxera* sehr widerstandsfähig. Rebstock kräftig, dauerhaft, ertragreich, aber sehr schwierig in der Vermehrung. Blatt mittelgross, ein wenig eingeschnitten und wollig. Traube mittelgross, ästig, etwas dichtbeerig. Beere mittelgross oder klein, rund, dunkelblau, beduftet, sehr viel Farbstoff enthaltend, spätreifend.

D.

Delaware, roth, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Ohio, New Jersey). Syn. Heath. Nach Planchon, pag. 190, „Weinlaube“ 1870, pag. 83, und Pulliat. Rebstock von mässigem Wachstum, etwas empfindlich gegen Kälte und insbesondere gegen die Angriffe der *Phylloxera*, wesshalb man schon versuchte, sie auf härtere und weniger empfindliche Sorten umzupfropfen. Blatt mittelgross, oben glatt, unten blaugrün, feinwollig, ziemlich tief eingeschnitten, ungleich und kurz gezähnt. Traube klein, ziemlich dichtbeerig, kurz, cylindrisch; Blattstiel ziemlich lang und oft fruchtbar. Beere klein, beinahe rund, dunkelroth, beduftet, dünnhäutig, von angenehmem, süsssem Geschmack, ziemlich frühreifend.

Devereux, siehe Black July.

Diana, hellroth, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 145, und Grape Cultur. I, pag. 7. Zu *Vitis labrusca* gehörig und bemerkenswerth durch ihre dicke Schale, welche ihre lange Aufbewahrung gestattet. Blatt sehr gross, unten weissfilzig. Beere rund, roth, spätreifend.

E.

Elsinburg, blau, Kelter- und Tafeltraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 174, und Grape Cultur. I, pag. 242. Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Syn. Elsinboro, Elsinborough. Holz dünn, weitknotig. Blatt fünflappig, tief eingeschnitten, klein, dunkelgrün. Traube

sehr klein, ästig, ziemlich locker. Beere klein, rund, dickhäutig, blau, beduftet, von angenehmem Geschmack.

Eumelan, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 152. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Holz kräftig, kurzknötig. Blatt gross, dick, dunkelgrün. Traube sehr gross. Beere gross, blau, beduftet, dünnhäutig, frühreifend und von angenehmem, süssem Geschmack.

F.

Fuchstraube, rothe, siehe Bland.

G.

Goethe, gelb, Tafeltraube. Amerika (Missouri). Nach Planchon, pag. 164, und Pulliat (Roger's Hybrid Nr. 1). Rebstock kräftig, dauerhaft und ertragreich. Blatt gross, eingeschnitten, wollig. Traube ziemlich gross, dichtbeerig, zuweilen ästig. Beere sehr gross, grünlichgelb, auf der Sonnenseite bisweilen mit röthlichem Anflug, durchscheinend, dünnhäutig, rund, sehr saftig und von angenehmem, besonders gewürztem Geschmack, mit wenigen Kernen.

Golden Clinton, siehe Clinton.

H.

Hartford prolific, blau, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Connecticut, Missouri). Nach Planchon, pag. 153, und Pulliat. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Rebstock stark, dauerhaft und sehr ertragreich. Blatt sehr gross, unten weissfilzig, wenig eingeschnitten. Traube gross, ästig, pyramidal, ziemlich dichtbeerig. Beere ziemlich gross, rund, blau, mit starkem Beigeschmack, wegen seiner frühen, oft im August schon eintretenden Reife schätzenswerth.

Herbemont, blau, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Georgien, Missouri, Tennessee). Syn. Waren, Herbemonts Madeira, Warenton, Neil Grope. Nach Pulliat, vignoble, pag. 151, mit Abbildung Nr. 76, und Planchon, pag. 175. Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Rebstock sehr starkwüchsig, gegen Frost etwas empfindlich und besonders auf Kalkboden sehr ertragreich. Blatt sehr gross, oben glatt, unten etwas wollig, ziemlich tief eingeschnitten, kurzstielig; Triebspitzen gelblichgrün, weisswollig, mit rothem Rande. Traube gross, länglich, ästig, sehr langstielig. Beere klein, rund, kurzstielig, violett, spätreifend, etwas herb. Gegen Phylloxera sehr widerstandsfähig.

Hermann, blau, Keltertraube. Amerika (Missouri). Zu *Vitis aestivalis* gehörig. Nach Planchon, pag. 178. Rebstock von kräftigem

Wachstum und sehr ertragreich. Blatt ziemlich tief eingeschnitten. Traube lang (oft bis 23 Centimeter), selten ästig, dichtbeerig. Beere klein, rund, blau, beduftet, ziemlich saftig, spätreifend.

Hine, blau, Keltertraube. Amerika (Ohio). Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 154, und Pulliat. Blatt gross, ziemlich wollig, wenig eingeschnitten. Traube mittelgross, dichtbeerig, etwas ästig. Beere mittelgross, rund, blau, beduftet.

I und J.

Jaquez, blau, Keltertraube. Amerika (Alabama). Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Syn. Ohio, Jack, Mac Candless, Cigar-Box Grap, Black Spanish. Nach Planchon, pag. 179, und Pulliat. Blatt sehr gross, beinahe glatt, etwas wollig, ziemlich eingeschnitten. Traube ziemlich gross, pyramidal, langstielig. Beere klein, rund, blau, saftig, gibt einen guten Rothwein, spätreifend.

Jona, roth, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 145, und Pulliat. Blatt sehr gross, wollig, eingeschnitten. Traube mittelgross, beinahe cylindrisch, etwas dichtbeerig. Beere mittelgross, rund, roth, beduftet, etwas frühreifend.

Isabella, blau, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Süd-Carolina, Georgien). Zu *Vitis labrusca* gehörig. Syn. Captraube, Raisin du Cap. Nach Trummer, pag. 269, Planchon, pag. 140, und Pulliat. Rebstock stämmig und dauerhaft, mit schlankem, weitknotigem, dunkelbraunem Holz, sehr frühblühend. Blatt sehr gross und decorativ, rund, dick, dreilappig, kurz eingeschnitten, kurz und stumpf gezähnt, oben glatt, graugrün, unten weissfilzig; Tribspitzen weisswollig, mit schönem, rothem Rand; Blattstiel dick, lang, röthlich. Traube mittelgross, locker, meist einfach, langstielig. Beere etwas länglich, rothblau, mit röthlichweissen Punkten, beduftet, dickhäutig, fleischig, mit starkem, fuchsigem Geschmack. Von ihr sollen noch weisse und andere Spielarten existiren.

Israela, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 136, und Pulliat. Zu *Vitis labrusca* gehörig und wahrscheinlich von Isabella abstammend. Soll gegen *Phylloxera* widerstandsfähig sein. Rebstock kräftig und dauerhaft. Blatt sehr gross, dunkelgrün, oben glatt, unten weissfilzig, wenig eingeschnitten, langstielig; Tribspitzen wie bei Isabella. Traube mittelgross, etwas locker, langstielig. Beere länglich, langstielig, dickhäutig, blau, stark beduftet, fleischig.

Ives Seedling, blau, Keltertraube. Amerika (Cincinnati, Ohio). Zu *Vitis labrusca* gehörig. Syn. Ives Madeira. Nach Planchon, pag. 134, Pulliat und Grape Cultur. I, pag. 42. Blatt sehr gross, beinahe glatt, sehr wollig, ziemlich eingeschnitten. Traube ziemlich gross, etwas dichtbeerig, öfters ästig. Beere mittelgross, länglich, blau, beduftet.

L.

Lenoir, blau, Keltertraube. Amerika (Carolina). Zu *Vitis aestivalis* gehörig und gegen *Phylloxera* widerstandsfähig. Nach Planchon, pag. 181, und Pulliat. Blatt gross, etwas wollig, ziemlich eingeschnitten. Traube ziemlich gross, ästig, etwas locker. Beere klein, rund, blau, beduftet, spätreifend.

Lincoln, siehe Black July.

Lindley, roth, Kelter- und Tafeltraube. Amerika. (Roger's Hybrid Nr. 9.) Nach Planchon, pag. 165; und Pulliat. Rebstock sehr starkwüchsig, mit weitknotigem Holz. Blatt ziemlich gross und wollig, etwas eingeschnitten. Traube klein, pyramidal, etwas locker. Beere ziemlich gross, rund, roth, beduftet.

Logan, blau, Keltertraube. Amerika (Ohio). Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 154, und Pulliat. Holz dünn. Blatt mittelgross, etwas dick, ziemlich wollig und eingeschnitten. Traube klein, pyramidal, etwas dichtbeerig. Beere ziemlich gross, länglich, blau, beduftet, etwas frühreifend.

Longs, siehe Cunningham.

Louisiana, blau, Keltertraube. Amerika (Missouri). Zu *Vitis aestivalis* gehörig. Nach Planchon, pag. 184, und Grape Cultur. I, pag. 42. Rebstock starkwüchsig, dauerhaft, aber gegen Kälte empfindlich. Traube mittelgross, ästig, dichtbeerig. Beere klein, rund, blau, saftig, von gutem Geschmack.

Lydia, grün, Keltertraube. Amerika (Lac Érié). Zu *Vitis labrusca* gehörig. Nach Planchon, pag. 154. Stock und Blatt der Isabella sehr ähnlich. Traube gross. Beere gross, länglich, hellgrün, auf der Sonnenseite lachisfarbig, dünnhäutig von angenehmem Geschmack.

M.

Marion, blau, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis cordifolia* gehörig und gegen *Phylloxera* sehr widerstandsfähig. Nach Planchon, pag. 196. Traube gross. Beere länglichrund, dunkelviolet, fleischig, spätreifend, aber frühtreibend.

Martha, weiss, Keltertraube. Amerika (Missouri). Zu *Vitis labrusca* gehörig. Nach Planchon, pag. 137, und Pulliat. Rebstock sehr kräftig und ertragreich. Blatt ziemlich gross, sehr wollig, ziemlich eingeschnitten. Traube etwas klein, ästig, dichtbeerig. Beere mittelgross, rund, weissgelb, beduftet, ziemlich spätreifend. Soll gegen *Phylloxera* widerstandsfähig sein.

Maxatawney, weiss, Kelter- und Tafeltraube. Amerika (Pennsylvanien). Syn. Macatawny. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 155, und Pulliat. Rebstock sehr starkwüchsig und dauerhaft, hart gegen Kälte. Blatt gross, etwas blasenartig und wollig, ziemlich tief eingeschnitten. Traube mittelgross, etwas ästig, pyramidal, ziemlich dichtbeerig. Beere mittelgross,

länglich, gelblichweiss, auf der Sonnenseite braun gefleckt, dünnhäutig, wenig Kerne enthaltend, von angenehmem Geschmack.

Miles, blau, Keltertraube. Amerika (Pennsylvanien). Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 156, und Pulliat. Rebstock von mässigem Wachstum. Blatt mittelgross, wollig, ziemlich eingeschnitten. Traube klein, pyramidal, etwas locker. Beere mittelgross, länglich, blau, beduftet, ziemlich frühreifend.

Miners Seedling, siehe Venango.

N.

North America, blau; Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 156, und Pulliat. Blatt ziemlich gross, wollig, wenig eingeschnitten. Traube klein, cylindrisch, etwas dichtbeerig. Beere klein, rund, blau, beduftet, ziemlich saftig. Soll nur wenig fruchtbar sein.

North Carolina, blau, Keltertraube. Amerika (Pennsylvanien). Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 138, und Pulliat. Rebstock sehr starkwüchsig und fruchtbar. Blatt ziemlich gross, dunkelgrün, ziemlich wollig, glatt, fast gar nicht eingeschnitten. Traube mittelgross, etwas ästig und dichtbeerig. Beere ziemlich gross, länglich, blau, beduftet, ziemlich frühreifend.

Norton's Virginia, blau, Keltertraube. Amerika (Virginien). Zu *Vitis aestivalis* gehörend und gegen *Phylloxera* sehr widerstandsfähig. Nach Planchon, pag. 186; Pulliat und „Weinlaube“ 1870, pag. 83. Syn. Norton, Nortons Seedling. Rebstock starkwüchsig, dauerhaft und tragbar bei günstigem Standorte, besonders in späteren Jahren, aber schwer zu vermehren. Blatt ziemlich gross, etwas mit röthlicher Wolle bedeckt, wenig eingeschnitten. Traube lang, ästig, dichtbeerig, mittelgross. Beere klein, blau bis violett, etwas beduftet und spätreifend.

O.

Ohio, siehe Jaquez.

Ontario, siehe Union Village.

P.

Pauline, violett, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Syn. Red Lenoir, Burgundy of Georgia. Nach Planchon, pag. 187, und Pulliat. Rebstock verlangt sehr warme Lage. Blatt sehr gross, wellenförmig verbogen, etwas wollig, wenig eingeschnitten. Traube klein, pyramidal, etwas locker. Beere klein, rund, blau-roth, beduftet, sehr spätreifend.

Pedee, siehe Scuppernony.

Perkins, blasslila, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 156. Traube gross, ästig, dichtbeerig. Beere mittelgross, länglich, helllila, saftig, dickhäutig, mit etwas Beigeschmack.

R.

Raisin du Cap, siehe Isabella.

Rebecca, weiss, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 157. Traube mittelgross, dichtbeerig, cylindrisch. Beere klein, länglich, hellgrün, bei voller Reife braun gefleckt, beduftet, dünnhäutig. Blatt mittelgross, sehr tief eingeschnitten.

Red River, siehe *Cynthiana*.

Red fox, siehe *Blanda*.

Rentz, blau, Keltertraube. Amerika (*Cincinnati*). Zu *Vitis labrusca* gehörig. Nach Planchon, pag. 137, und Pulliat. Rebstock sehr starkwüchsig und gesund in Blatt und Holz, ertragreich. Blatt mittelgross, etwas blasenartig, unten mit röthlicher Wolle bedeckt, wenig eingeschnitten. Traube mittelgross, dichtbeerig, pyramidal. Beere mittelgross, rund, fleischig, blauroth.

Richmond, blau, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis rotundifolia* gehörig. Nach Planchon, pag. 127. Eine sehr frühreifende Traubensorte mit länglichen Beeren von aromatischem, angenehmem Geschmack.

Rogers' Hybrid. Unter diesem Namen sind bei Planchon, pag. 166, mehrere Züchtungen von Rogers aufgeführt, welche meist rothe Beeren haben und noch nicht genau beschrieben sind.

Rulander, siehe *Sainte Geneviève*.

S.

Salem, roth, Kelter- und Tafeltraube. Amerika. (*Rogers' Hybrid* Nr. 53.) Nach Planchon, pag. 167, und Pulliat. Rebstock sehr kräftig und dauerhaft, mit hellbraunem Holz. Blatt sehr gross, etwas eingeschnitten, weisswollig. Traube ziemlich gross, ästig, etwas dichtbeerig. Beere rund, hellroth.

Sainte Geneviève, blau, Keltertraube. Amerika (*Missouri*). Zu *Vitis aestivalis* gehörend. Syn. *Rulander*, *Amoureux*. Nach Planchon, pag. 188, und Pulliat. Rebstock kräftig, mit kurzknötigem Holz, das im Winter bedeckt werden muss. Blatt klein, herzförmig, wenig wollig und eingeschnitten. Traube ziemlich klein, dichtbeerig, pyramidal. Beere klein, blau, beduftet, rund. Da diese Traubensorte quantitativ geringe, aber qualitativ gute Erträge liefert und einen hochfarbigen Wein geben soll, so wäre erst noch weiter festzustellen, ob diese Traubensorte nicht eine Burgunder Spielart sei, worauf der Synonym „*Rulander*“ schon hindeutet.

Scuppernony, weiss, Keltertraube. Amerika (Carolina). Zu *Vitis rotundifolia* gehörend und gegen *Phylloxera* sehr widerstandsfähig. Rebstock sehr fruchtbar. Blatt sehr klein, herzförmig, glatt, glänzend, gar nicht eingeschnitten. Traube sehr klein, mit wenigen Beeren, etwas locker. Beere ziemlich gross, rund, weissgelb, auf der Sonnenseite oft braun gefleckt, sehr spätreifend.

T.

Taylor, gelb, Keltertraube. Amerika (Kentucky). Zu *Vitis cordifolia* gehörend und sehr widerstandsfähig gegen *Phylloxera*. Syn. Bullit, Bullet. Nach Planchon, pag. 197, und Pulliat. Rebstock soll nur am älteren Holz fruchtbar sein. Blatt ziemlich gross, glatt, glänzend, mit rothem Blattstiel und Rippen, wenig eingeschnitten. Traube sehr klein, unregelmässig, cylindrisch, etwas locker. Beere sehr klein, rund, gelb, mit röthlichem Anflug.

Telegraph, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 189. Zu *Vitis aestivalis* gehörend und der Sorte „Christine“ etwas ähnlich. Traube mittelgross. Beere länglich, blau, beduftet, saftig und von angenehmem Geschmack, frühreifend.

Tokalon, blau, Keltertraube. Amerika. Syn. To Kalon, Winan, Spofford seedling, Carter. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 157. Rebstock kräftig und fruchtbar, aber etwas empfindlich. Traube gross, ästig. Beere länglich, dunkelblau, stark beduftet, spätreifend.

U.

Underhills Seedling, roth, Keltertraube. Amerika. Zu *Vitis labrusca* gehörig. Nach Planchon, pag. 157. Rebstock kräftig, dauerhaft und ertragreich. Traube ziemlich gross, etwas dichtbeerig. Beere mittelgross, rund, dünnhäutig, frühreifend, ganz wie Catawba gefärbt.

Union Village, blau, Keltertraube. Amerika (Ohio). Syn. Shaker, Ontario, Imitation Hamburg. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Planchon, pag. 158, und Pulliat. Rebstock sehr starkwüchsig, aber gegen Frost empfindlich. Blatt sehr gross, etwas eingeschnitten, wollig. Traube ziemlich gross, pyramidal, dichtbeerig. Beere gross, länglichrund, blau, beduftet.

V.

Venango, roth, Keltertraube. Amerika (Alleghany). Nach Planchon, pag. 158. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Syn. Miners Seedling. Rebstock kräftig und ertragreich. Traube mittelgross, dichtbeerig. Beere ziemlich gross, rund, hellroth, beduftet, dickhäutig, mit Beigeschmack.

Vorlington, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Pulliat. Blatt klein, wollig, beinahe rund. Traube klein, cylindrisch, etwas dichtbeerig. Beere klein, rund, blau, mit bräunlichem Anflug, ziemlich frühreifend.

W.

Waren oder Warren, siehe Herbemont.

Walter, roth, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 167. Rebstock von kräftigem Wachstum, mit dunkelbraunem, engknotigem Holz. Blatt gross, dick, glatt. Traube mittelgross, ästig, etwas dichtbeerig. Beere mittelgross, rund, hellroth, saftig und süss.

Wilder, blau, Keltertraube. Amerika. Nach Planchon, pag. 161, und Pulliat. (Rogers' Hybrid Nr. 4.) Rebstock kräftig, dauerhaft, ertragreich. Blatt gross, oben glatt, unten weissfilzig, etwas eingeschnitten. Traube mittelgross, kurz, kegelförmig, etwas dichtbeerig. Beere gross, rund, dunkelblau, beduftet, dickhäutig, mit etwas Beigeschmack. Soll gegen Phylloxera widerstandsfähig sein.

Wilmington, weiss, Keltertraube. Amerika (Delaware). Nach Planchon, pag. 159. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Rebstock sehr kräftig. Traube gross, locker, bisweilen ästig. Beere gross, rund, in's Längliche, grünlichweiss, bei voller Reife, welche spät eintritt, gelblich, von etwas herbem Geschmack.

Worthington, siehe Clinton.

Y.

York Madeira, blau, Keltertraube. Amerika (Pennsylvanien). Syn. Canby's August, Black German, Wolfe, Large German, Monteith, Marion, Port, Tryon und Blauer himbeerartiger Madeira. Zu *Vitis labrusca* gehörend. Nach Trummer, Nachtrag, pag. 68, und Planchon, pag. 159. Rebstock sehr stark, dauerhaft gegen Kälte, mit langgestrecktem, dünnem, dunkelbraunem, weitknotigem Holz. Blatt mittelgross, dick, dreispitzig, oben dunkelgrün, mit gelben Flecken, unten feinwollig, klein und stumpf gezähnt; Triebspitzen grün, beim Entfalten rosenroth, wenig wollig; Blattstiel und Rippen etwas röthlich. Traube mittelgross, einfach, locker, dünnstielig. Beere rund, dunkelblau, weiss beduftet, dünnhäutig, ziemlich frühreifend und kurzstielig, süss, mit Himbeergeschmack. Soll gegen die Phylloxera widerstandsfähig sein.

Nach Planchon's Angaben vertheilen sich die hier beschriebenen amerikanischen Traubenvarietäten in folgende fünf Gruppen, wobei die besonders gegen Phylloxera widerstandsfähigen Varietäten **fett** gedruckt sind. Hierbei muss die Bemerkung hinzugefügt werden, dass bei den Beschreibungen der amerikanischen Traubenvarietäten und Hybriden und ihrer Gruppierung noch mancherlei Irrthümer herrschen und auch die Angaben über Widerstandsfähigkeit gegen Phylloxera nur mit Vorsicht aufzunehmen sind.

1. Gruppe.

Zu *Vitis aestivalis* gehörend.

Alvey.	Cunningham.	Hermann.	Nortons Virginia.
Baldwin.	Cynthiana.	Jaquez.	Pauline.
Baxter.	Elsinburg.	Lenoir.	Sainte Geneviève.
Black July.	Herbement.	Louisiana.	Telegraph.

2. Gruppe.

Zu *Vitis labrusca* gehörend.

Adirondac.	Concord.	Israella.	Perkins.
Alexander.	Creveling.	Iver Seedling.	Rebecca.
Amanda.	Cuyahoga.	Logan	Rentz.
Anna.	Diana.	Lydia.	Tokalon.
Black Hawk.	Eumelan.	Martha.	UnderhillsSeedling
Bland.	Hartford prolific.	Maxatawney.	Union Village.
Cassady.	Hine.	Miles.	Venango.
Catawba.	Jona.	North America.	Wilmington.
Christine.	Isabella.	North Carolina.	York Madeira.

3. Gruppe.

Zu *Vitis cordifolia* gehörend.

Augwick.	Clinton.	Golden Clinton.	Marion.
		Taylor.	

4. Gruppe.

Zu *Vitis rotundifolia* gehörend.

Richmond.	Scuppernony.
-----------	---------------------

5. Gruppe.

Hybriden.

Agawam.	Brant.	Delaware.	Salem.
Allens Hybrid.	Canada.	Goethe.	Vorlington.
Autuchon.	Challenge.	Lindley.	Walter.
Barry.	Cornucopia.	Rogers Hybrid.	Wilder.